

ВЕЛЕСОВА СЛОБОДА

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

А

Австралид (*Homo sapiens australasicus*; ново-голландская раса по Агассису)

Одна из больших рас *Homo sapiens*; тип австралийских аборигенов, включая тасманских. Как и веддида в Южной Азии, австралиды сохранили большинство общих плейстоценовых морфологических черт вида *sapiens*. Они характеризуются длинной, низкой и узкой головой, низким, широким и овальным лицом со скошенным лбом, ярко выраженными надбровными дугами, широким, вогнутым носом, размещенным в глубокой носовой впадине, очень сильным прогнатизмом. Глазные яблоки посажены глубоко, губы толстые. Кожа от коричневой до темно-коричневой. Рост волосяного покрова сильный; волосы обычно волнистые, иногда вьющиеся, типично черные или темно-коричневые, хотя более светлые, красноватые оттенки все же встречаются. Глаза темно-коричневые. Подтипы: *барринеанский*, *карпентарианский*, *мурраянский* и *тасманидний*.



Австралид
(К.С. Кун, Происхождение рас, 1962)



Череп австралида

Австралиформный

Подобный или близкий по некоторым характеристикам австралидному типу.

Австралоиды

Парасемья темнокожих расовых типов Океании и Азии, включающая, прежде всего, *австралида*, *веддида* и *меланезида*, которые представляют в той или иной степени отражение плейстоценовых черт. Настоящее родство между этими расами не ясно до конца, и последние исследования показывают возможность разного происхождения, таким образом данное деление весьма условно.

Адаптация

Функциональное приспособление организма или популяции к окружающей среде. Адаптация является результатом эволюционных изменений (в особенности, результатом *естественного отбора*).

Адаптивная зона

Особенный тип окружающей среды, требующий уникальных адаптивных качеств и позволяющий возникнуть *адаптивной радиации*.

Адаптивная радиация

Эволюционное развитие единого типа в несколько отдельных видов.

Адаптивность

Черта, увеличивающая шансы репродуктивного успеха при определенных условиях окружающей среды (в *адаптивной зоне*).

Адриатический тип

= *динарский тип* по типологии Деникера.

Азиат черный

В обычной речи так называют любого темнокожего представителя немонголоидных и неевропеоидных популяций Восточной Азии, включая меланезидов, негритидов и веддидов. В расологии данный термин не применяется.

Аинуид (аиноид; курилид)

Специфический тип, отражающий расовый субстрат в японской популяции; он представлен, или точнее, был представлен айнами с острова Хоккайдо, южного Сахалина и Курил. Аинуиды мелкие по строению, крепкие, с широкими лицами, широкими носами и значительным ростом волос на теле. Они *сундадонты*, и не являются монголоидами. Их ассимиляция является предметом крупной дискуссии, но первоначальное

суждение о их европеоидном происхождении, похоже, противоречит результатам более поздних исследований, который привели к обнаружению близкого родства аинуидов с полинезидами из Полинезии и Юго-Восточной Азии. См. *амурид*.



Аинуид
(по Гловацкому)

Аистин (аисто-нордид)

По типологии Лундмана, высокорослый, высокоголовый нордический тип, распространенный в Эстонии и западной Финляндии.

Акклиматизация

Физиологическое приспособление к изменениям окружающей среды, происходящим в течение жизни индивида; такое приспособление может быть кратковременным. Способность к акклиматизации может быть присуща как популяции в целом, так и отдельным индивидам. Эта способность зависит от генов и, таким образом, подвержена эволюционным процессам, таким как *естественный отбор*.

Аллель

Альтернативная форма гена. Аллели расположены в тех же частях хромосомы и, следовательно, управляют теми же признаками. Однако, в силу их различий, результат их действия может различаться. Данный термин также часто используется как синонимичный термину *ген*.

Аллена закон


Биологический закон, разработанный Джоэлем Асафом Алленом в 1877, согласно которому теплокровные (млекопитающие и птицы) в холодном климате обладают более короткими и полными членами, чем эквивалентные им теплокровные в более жарком климате. Этот процесс напрямую связан с удержанием (в холодном климате) и сбросом (в жарком климате) высокой температуры тела, что зависит от отношения массы тела к его поверхности. См. *Бергманна закон*, *бореализация*.

Аллометрия

Исследование роста отдельно взятой части организма в ее связи с ростом организма в целом.

Аллопатрическое видообразование

Тип видообразования, при котором популяция разделяется на две (или более) географически изолированные группы, что приводит к двойственности и последующей репродуктивной изоляции (появление новых биологических подвидов). См. *периферийной изоляции видообразование*.



Аллопатрическое видообразование

Альбинос

Полностью депигментированный индивид. Такое явление известно как *альбинизм*.

Альвеолярный прогнатизм

Выступление вперед частей челюсти, в которых расположены зубы и корни зубов. См. *прогнатизм*.

Альпинид (остиг (восточный тип) по Гюнтеру; западный альпинид; западно-европейский тип по Деникеру)

Названный так Рипли, альпинидный тип является важным элементом западно- и центрально-европейских типов. Он мелкого или среднего сложения, брахицефален, характерно круглоголов и круглотел, широколиц, средней или темной пигментации. Альпинидный тип господствует в центральных частях Франции, часто встречается в южной Германии (особенно в Баварии) и в Альпах. Центрально-европейский альпинид, похоже, происходит от кроманьонского типа, измененного процессом *альпинизации* (см. *борреби, горид*)



Французский альпинид
(из Расы Европы К.С. Куна)



**Череп альпинида
(по Гюнтеру)**

Альпинизация

Эволюционный процесс или тенденция к редукции, брахицефализации и инфантилизации, который, возможно, является следствием адаптации к низко-энергетическому, малоподвижному существованию. К целиком или частично альпинизированным (*альпиноиды*) популяциям европеоидов относят *альпинида*, *борреби* и *горида*.

Альпиноид

Любой альпинизированный тип, независимо от степени ассимиляции.

Альпиноид азиатский

Общий термин, служащий для определения любых альпинизированных не-европейских популяций Евразии.

Альфёльди тип

Предполагаемый первоначальный тип тюрко-говорящего элемента в венгерской популяции

Американская тропикальная раса

Относительный эквивалент *централида* по типологии Агассиса.

Америнд

= *индианид*.

Амурид

Предполагаемый предшественник современного айнуидского типа в Японии.

Амур-сахалинид

Подтип *тунгида*, распространенный в низовьях Амура, на Сахалине и Курилах, представленный нивхами (гиляками) и родственными народами. Отличается от других тунгидов (среди прочего, *таигида*) более сильным ростом бороды и заметным прогнатизмом. Эти черты могут быть следствием смешения с айнуидами.



**Нивхская (гилякская) женщина
амур-сахалинидского подтипа.**

Амфинезийская раса

= *полинезийская раса* по типологии Хаксли.

Анагенезис

Последовательное развитие новой разновидности из предыдущей.

Анатолид (анадолид)

В большей степени Арменоид, смешанный с медитерранидом (в большинстве случаев - с древним *каппадокийским типом*), представляющий собой господствующий расовый тип среди турков (в Турции). Анатолиды обычно более правильно сложены, лептоморфны, и немного более длинноголовы, чем собственно арменоиды.



Турок-анатолид

Англо-саксонский тип

Специфический северо-западный европеоидный тип, выделенный Куном, и традиционно ассоциирующийся с западно-германо-язычными народами (фризийцы, англы, саксы итд.). Основой типа служит *хальштаттский нордический тип*, измененный в результате смешения с кроманьидами и типом


культуры шнуровой керамики. Англо-саксонский тип в настоящее время распространен на Британских островах, в особенности в юго-восточной Англии. Он близок *фритерпийскому* типу, с которым у него общее германское происхождение (см. *древне-германский райенгреберский тип*).



Англо-саксонский тип
(Майкл Кэйн)

Андаманид (минкопис по Хаксли)

Пигмейный негритидный тип аборигенов Андаманских и Никобарских островов в Бенгальском заливе. Андаманиды мелки по сложению, темнокожи, с крайне вьющимися волосами, и по многим показателям сходны с семангами Малайского полуострова и аэтами Филиппин, которые также являются представителями негритидной расы. Существует несколько изолированных племен, среди прочего Онге, Джарава, Большие Андаманиды и Сентинели, внутри которых можно выделить некоторые, весьма незначительные, различия. К примеру, Сентинели (Северный Сторожевой остров) немного более высоки, чем представители остальных групп.



Андаманид
из племени Джарава

Андид

Тип индианида. Андиды малы, мезо-брахицефальны, заселяют Анды (Кечуа, Араукани), побережье Эквадора, Перу и Чили. Они характеризуются сильным эпикантусом (но нетипично монголоидным строением глаза), крепким сложением, прямым или выгнутым носом с относительно высокой переносицей, гладкими волосами и средне-темно-коричневой кожей.



Андид
(по Гловацкому)

Аннулярное (кольцевое) сжатие

Искусственный метод изменения формы головы при помощи обматывания. См. также *положение в колыбели, позиционная плагиоцефалия*.

Антропометрия

Физико-антропологическая дисциплина, занимающаяся измерениями физических характеристик человека. См. также *цефалометрия, краниометрия*.

Апикальный предок

Предок мужского или женского пола, от которого прослеживается происхождение ("вершина" треугольника происхождения).

Апоморфия

Новая эволюционная черта, уникальная для разновидности и ее потомства, которая может быть использована как характерная определяющая черта при филогенетическом анализе группы. См. *аутапоморфия, синапоморфия*.

Аппалачид

Восточный подтип *сильвида*, господствующий вдоль восточного побережья Северной Америки, особенно в Аппалачах (к примеру, могиране и делавары). См. *планид*.

Арабид


Южный ориенталидный тип, первоначально ассоциировавшийся с семито-язычным населением Ближнего Востока, представленный в наши дни бедуинами Омана. Лундман выделял также *сиридский подтип*.



Арабид

Аралид

Согласно типологии фон Эйкштедта, аралид - это центрально-азиатский *туранид* с сильным влиянием *тунгида*. Аралиды являются основным расовым элементом среди казахов, а также часто встречаются среди узбеков и уйгуров.



Аралид (по Швидецки)

Аранский тип

Изолированный и специализированный тип, распространенный на Аранских островах к западу от берегов Ирландии. Происходит от *кельтского нордического типа*.

Аранский тип
(из Расы Европы К.С. Куна)**Арктическая раса**

= *арктический монголоид* (скорее *эскимид*) по типологии Агассиса.

Арктид

= арктический монголоид.

Арктический монголоид (*арктическая раса по Агассису; арктид; бореалид*)


Монголоидная группа в Сибири, в регионе Чукотки и Камчатки, и на большинстве обитаемых арктических территорий Северной Америки и Гренландии. Арктические монголоиды отличаются более пикническим и мускулистым сложением, меньшей плоскостью лица, более широкой нижней челюстью, более редко распространенным эпикантусом, более тонкими губами, мезогнатией, большим и узким носом и очень толстыми волосами. Арктические монголоиды включают в себя *эскимидов* и *сибиридов*.

Аркус сенилис (*arcus senilis*)


Жировой запас в роговице глаза, обычно серого или голубого цвета, который создает частичную или полную иллюзию светлого оттенка глаз.

Арменид (*ассироид по Деникеру; переднеазиатский тип по Гюнтеру*)

По большей части брюнетный, большеголовый тип *таурида*, впервые подробно описанный фон Лушаном (как *арменоидный тип*). Напоминает европейского динарида, исключая большие абсолютные лицевые размеры и большой нос. Армениды преобладают среди армян, и часто встречаются вплоть до Ближнего Востока, где, смешавшись с *арабидом*, создают легко распознаваемый ближневосточный фенотип (см. *ассирид*). Согласно Куну, арменид (*арменоид* по его типологии) - это результат *динаризации* иранида (*ирано-афганской расы*, по типологии Куна). См. также *анатолид*, *кавказид*.



**Арменид
(по Гловацкому)**



**Череп арменида
(по Гюнтеру)**

Арменоидный тип

Ближневосточная парасемья *тауридов*, включающая *арменида* (относительно несмешанный таурид), *анатолида* (арменид с медитерранидной примесью), *ассирида* и *кавказида* (арменид с динарской примесью).

Ассирид

Смесь *арменоидного* типа с *арабидом*, среднего роста и крепкого сложения.

Ассиرويد

= *арменид* по типологии Деникера.

Ассортативное соединение

Тенденция притяжения подобного подобным. Соединение может быть характерно как для генотипа (к примеру, индивиды с генотипом АА притягиваются к другим индивидам генотипа АА) так и для фенотипа (к примеру, высокие индивиды соединяются с другими высокими индивидами).

Атавизм

Возрождение характерной черты в организме после отсутствия ее в продолжении нескольких поколений - "шаг назад" - обычно происходящий из-за случайной рекомбинации генов.

Ателиотический карлик

Индивид с нормальными пропорциями, но необычайно низкого роста. См. *ахондропластический карлик*.

Атертона плато пигмей

= *барринеанский тип*.

Атлантид (нордо-медитерранид)

1) Частично депигментированный северный медитерранид, согласно фон Эйкштедту ("Медитерраниды в Уэльсе", 1935г.).

2) Общий термин более современного происхождения, используемый для всего диапазона смесей нордида-атланта-медитерранида/медитерранида, с типично более темной пигментацией, которые можно обнаружить по всей Западной Европе, в особенности в прибрежных районах.

Атланта-медитерранид (литеральный европейский тип по Деникеру)

Высокий, прямоносый и сильнодолихоцефальный медитерранидный тип, живой эквивалент древнего скелетного *мегалитического типа* (по типологии Куна). Намного более высок и крепок, чем *грацильный медитерранидный тип*, от которого он происходит и с которым зачастую смешивается. Атланти-медитерранидный тип является значительным расовым элементом в составе населения Иберийского полуострова (господствуя в Каталонии и Валенсии), в Италии, на север по всему западному побережью Европы, вплоть до Британских островов (в смешанной форме, см. *норд-атлантид*). Кун включал всех высокорослых медитерранидов (включая *понтида*) в атланти-медитерранидный тип.



**Атланти-медитерранид
(по Биасутти)**

Ауригнацид

Общий термин, обозначающий ориньякскую разновидность кроманьонца, которая отличалась более узким лицом и эллипсоидным черепом, чем тип (типы), представленные более поздними кроманьонцами (*кроманьонидный тип*). В Комб-Капелль был обнаружен первый подобный экземпляр, и термин *капеллид* часто используется как синоним ауригнацида.

Аустрид

= *палео-монголид*.

Аутапоморфия

Апоморфия, уникальная для определенного вида.

Аутосомы

Все хромосомы, кроме половых.

Афалу-бу-Руммель

Серия черепов, найденных при раскопках в Афалу-бу-Руммель в Алжире. Череп массивные, характеризуются брахицефалией, широко- и крупноголовостью, низким, квадратным лицом, большой бигониальной шириной, и общим сходством с европейскими кроманьидами (в чем-то схожи с полуальпинизированными черепами *борребид*). Афалу-бу-Руммель часто сокращается до Афалу.



Афалу-бу-Руммель

Афганский тип

Доисторический скелетальный тип, названный Куном, который в настоящее время в некоторой степени представлен *иранидным типом* (*ирано-афганская раса* по Куну).

Африканского происхождения гипотеза

Гипотеза, согласно которой все человечество произошло от небольшой группы людей в Африке, которые затем расселились по Евразии, Океании и Америке, заменяя и вытесняя более ранних гоминидов. См. *мультирегиональная гипотеза*.

Африкоид

= негрід.

Ахондропластический карлик

Более распространенный вид карликов, характеризующийся короткими членами, большой головой, маленьким лицом со сплюсненной переносицей, нормальным туловищем и короткими руками. См. *ателиотический карлик*.

Аэта

Люди негритосской группы (представители *негритидной расы*), распространены на Филиппинах. Ростом подобны пигмеям, с темно-шоколадной кожей, крайне кудрявыми черными волосами, очень слабым ростом волос на теле, плоским, гиперплатириным носом, губами средней толщины, темно-коричневыми или черными глазами. Они брахицефальны, со средним головным индексом 82 (мужчины) и 86 (женщины), присутствует легко выраженный прогнатизм. Аэта во многих отношениях схожи с *семангами*, заселяющими Малайский полуостров, и *андаманцами* (*андаманидный подтип* негритидной расы), заселяющими Андаманские и Никобарские острова.



**Аэта негритидного типа
(из Лексикона Фишера)**

Б

Баикалид

= таигид.

Баланса модель

Гипотеза генетических изменений, согласно которой балансовая селекция является причиной большинства генетических изменений внутри популяции.

Балтид (остеуропид по фон Эйкштедту)

Балтизированный северо-восточный европейский кроманьид (*восточный кроманьид*). Собственно балтидный тип занимает промежуточное положение между по большей части нередуцированным, лишь слегка балтизированным и полностью европеоидным *западно-балтидным* типом и более балтизированным, с лаппоидным влиянием, *восточно-балтидным* типом в едином континууме, который, по сути, представляет собой переходный этап между *кроманьидами* и *лаппоидами* в северо-восточной Европе. Термин также может использоваться по отношению ко всему балтидному континууму, как к дебалтизированному западному балтиду, так и к лаппоидному восточному.



Балтид (Россия)

Балтизация

Эволюционный процесс, включающий в себя *редукцию*, *инфантилизацию*, *брахицефализацию* и *грацилизацию*. Балтизация схожа с *альпинизацией*, однако не влечет за собой редукцию в такой же степени, и ближе к *бореализации*. Как и альпинизация, балтизация может быть частичным результатом

приспособления к малоподвижной жизни земледельцев, но в большей степени является следствием холодного климата. Эта тенденция является отражением исторического развития *балтидных типов*.

Бамбутид (африканский пигмид)

Инфантилизованный негридный тип африканских пигмеев. Бамбутид представляет собой пример полной *редукции* и частичной *инфантилизации*, возможно, спровоцированных неблагоприятными условиями тропиков. Средний рост ниже 1,5 м, а туловище очень длинно по сравнению с ногами. Нос чрезвычайной широкий, эта черта у бамбутидов превосходит все другие расы и типы человека.



Бамбутид
(из лексикона Фишера)

Бантуид

= *кафрид*.

Барринеанский тип (пигмей плато Атертона; квинслендский негрит)

Австралидный подтип Северного Квинсленда, отличающийся малым ростом, который является результатом процесса *редукции* (возможно, развитие *in situ*). Барринеанский тип часто называют "австралидным пигмейским типом" и иногда путают с *негритидом*. Барринеанский тип ассоциируется с первой волной расселения австралийских аборигенов, предшествующей *мурраянскому* и *карпентарианскому* типам.



Барринеанский тип
(девушка)

Баскид

Смешанный, динариформный, в большей степени атланти-средиземноморный тип, ассоциируемый с баскским населением.



Баскид

Белая раса

= *европеоид* по типологии Блюменбаха.

Боевых топоров культуры тип

= *культуры шнуровой керамики тип*.

Бауплан

Базовые взаимосвязанные характерные черты вида.

Беддоу, Джон

(1826-1911) британский антрополог, опубликовал несколько наиболее ранних работ по современным расам, стал одним из первых авторитетов в этом вопросе. Он был членом-основателем Этнологического Общества и президентом Антропологического Общества (1869-1870).

Берберид

Кроманьидный тип Северной Африки, обычно смешанный с медитерранидным типом.



Берберид
(из Лексикона Фишера)

Бергманна закон

Биологический закон, сформулированный Кристианом Бергманном (1814-1865), который гласит: внутри единого вида, масса тела тем больше, чем выше широта и чем холоднее климат. См. *Аллена закон*.

Берид (палео-сардинский тип по Биасутти)

Низко-черепной, пикнический и немного редуцированный промежуточный медитеррано-кроманьидный тип.



Берид

Биасутти, Ренато

Итальянский антрополог.

Биологический вид

= *вид*.

Блондизм

Результат значительной депигментации кожи, волос и глаз. Предполагается, что эта черта является результатом возможной мутации гена MC1R и появилась в раннем палеолите у северно-европейских популяций, как результат приспособления к относительно низким уровням ультрафиолетового излучения, отвечающего за синтез витамина D в организме человека (витамин D - важный элемент крепости костей). Предполагается, что светлая кожа позволяет большему количеству ультрафиолетового излучения проникнуть в организм, что, в свою очередь, позволяет выработать необходимое для здорового развития количество витамина D. Половой отбор новых черт, таких как светлые волосы и глаза (возможно, "побочный эффект" общего сокращения уровня *меланина* в организме), также внес большой вклад в распространение данного фенотипа. Вопреки распространенному мнению, блондизм не является исключительно нордической чертой, а распространен среди всех европеоидов (по большей части - кроманьидов) на территории, центром которой является Балтийское море (*дало-фалиды, борреби, балтиды* итд.). Отсутствие подобной селекции среди *эскимидов* и прочих арктических типов, возможно, является результатом наличия достаточного количества витамина D в их питании.

Болдуина эффект

Теория американского философа и психолога Джеймса Марка Болдуина (1861-1934), согласно которой персональные качества, такие как обучение, в значительной мере влияют на развитие определенных разновидностей, которым присущи данные качества, внутри популяции.

Бореалид

= *арктический монголоид*.

Бореализация

Эволюционная адаптация к холодному климату, включающая в себя уменьшение нижних конечностей, расширение и удлинение туловища, пикническое сложение, округление и укорачивание головы и лица, увеличение жировой прослойки, и легкое уплощение лицевого профиля. См. *Аллена закон*.

Борреби (нордальпиноид)

Частично *альпинизированный* (*брахицефализированный* и немного *редуцированный*) и по большей части депигментированный кроманьидный тип Северной Европы, распространенный в северной Германии и Скандинавии.



Датчанин-борреби
(из Расы Европы К.С. Куна)

Боскопид

Древний тип современных *коисанидов*, от которого они произошли в результате *редукции* и *инфантилизации*. Тип был определен по черепу, найденному в 1913 году в Трансваале, Южная Африка.

Брадителия

Термин, введенный Г.Г.Симпсоном, описывающий эволюционный процесс, включающий в себя медленные, постепенные морфологические изменения с течением времени, в чем то схожий с эволюционным процессом по Дарвину. См. *горотелия*, *тахителия*.

Бразилид

Подтип *индианида*. Малорослый, крепко-сложенный мезоцефал, распространенный в джунглях бассейна Амазонки (включая прилегающие нагорья), на побережье Бразилии, в Венесуэле, Гайане и островах Вест-

Индии. Бразилиды характеризуются относительно плоскими, широкими лбами, овальными лицами, мягкими чертами лица, раскосыми, но не типично монголоидными глазами, средне-широким или широким носом с высокой переносицей, гладкими или слегка волнистыми волосами, желто-коричневой или коричневой кожей.



Карибский бразилид

Брахикраниальный

Обладающий черепным индексом 80,0 или больше; кругло-/коротко-/широко-черепной.

Брахицефальный

Обладающий головным индексом 80,0 или больше (83,34 и больше по французской системе); кругло-/коротко-/широкоголовый. Явление называется *брахицефалией*, а индивид с подобным головным индексом - *брахицефалом*.

Брюнн

В работах К.С.Куна "брюнном" называется нередуцированный и депигментированный северо-западный европейский верхнепалеолитический кроманьидный тип, распространенный в западной Ирландии и схожий с *дало-фалидом*. Определение типа крайне усложнено ввиду того, что скелетные останки, извлеченные в Брно/Брюнн (Чехия) принадлежат к типу ауригнацидов/капеллидов, а не к кроманьидному типу.



Брюнн
(из Расы Европы К.С. Куна)

Брюн, Хальфдан

(?-?) Норвежский антрополог, проводивший многочисленные антропологические исследования населения Норвегии. В 1920-х гг. тесно сотрудничал с К.Е.Шрайнером и А.Шрайнер, но их совместная работа вскоре была прервана из-за увлечения Брюна нордизмом, и он продолжал работать самостоятельно, в то время

как его работы обретали все большую популярность в Германии. Брюн наладил близкие отношения с Гюнтером и его женой, которые в то время проживали в Норвегии.

Бунак, Виктор Валерьянович

(1891-1979) Русский антрополог, проводивший исследования русского населения, разработал некоторые оригинальные методы в этнографии и физической антропологии.

Бурятско-монголоидный тип

По типологии Куна - брахицефализированный монголоидный тип с крайне монголоидными чертами.

В

Валле тип

Кроманьидный тип Норвегии, ранее ассоциировавшийся с населением деревень внутренних горных районов юго-западной части страны. Валле является - точнее, являлась - одной из таких изолированных деревень. Тип по большинству показателей можно отнести к кроманьидам, однако в то же время он близок к нордическим формам (возможно, вследствие процесса изолированной грацилизации). Тип валле можно назвать юго-западной разновидностью *трондера*.



Тип валле
(из Расы Европы К.С. Куна)

Валлонский тип

Специфическая смесь *борребии* и *альпинида*, распространенная среди бельгийских валлонов.

Веддид (дравидийский тип по Деникеру и др.; индо-аборигенный тип)

Расовый тип Юго-Восточной Азии, предположительно входящий в большую австралоидную группу; родство с австралоидами, тем не менее, неясно и может быть лишь следствием сохранения тех же генерализированных *плейстоценовых черт*. Веддиды низкорослы, грацильны и пикниморфны. Голова относительно низкая, лицо округлое и эурипрозопное, зачастую сильно развиты надбровные дуги. Нос средне-широкий, короткий и округлый, с отстающими крыльями, рот "детский", с опущенными уголками. Цвет кожи варьирует от средне-коричневого до темно-коричневого, волосы волнистые и черные, глаза карие. Веддиды распространены в горных лесах Индии и джунглях Шри-Ланки (*гондид, малид*, включая

промежуточных *индо-меланида* и *меланида*); также тип составляет важный популяционный элемент Индийского субконтинента. Распространение типа дальше на восток, за пределы Индии характеризуется легким переходом к *палео-монголиду*.



Веддид
(Из Лексикона Фишера)

Верхнепалеолитический

Любой из физических типов *homo sapiens*, известный со времени верхнего палеолита; иногда термин используется только по отношению к кроманьонцам и их современным потомкам.

Вестиш (Westisch)

= *медитерранид* по типологии Гюнтера.

Вестманландский тип

Скандинавская разновидность *дало-фалида* по типологии Лундмана.

Вид (биологический вид)

Базовая единица биологического различия; таксономическая категория рангом ниже рода и выше подвида (расы). Биологические виды характеризуются репродуктивной изолированностью.

Видообразование

Эволюция новых биологических видов. Существует четыре "типа" видообразования: *аллопатрическое*, *парапатрическое*, *симпатрическое* и *полиплоидальное*.

Внутривидовой

Относящийся к вариациям внутри вида.

Волгид

Согласно Лундману, очень низкорослый, темнопигментированный, высокочерепной и долихоцефальный тип восточной России; характеризуется широким, немного примитивным лицом, маленьким, пухлым носом. Как утверждает Лундман, данный тип также можно обнаружить на западе, в Богемии, где он более известен под названием "судетская раса". Взаимосвязь данных типов неясна, так как комбинации схожих черт присущи различным расовым типам по всей Центральной и Восточной Европе. См. *судетский тип*.

Воронкообразных кубков культура

Тип культуры ранней бронзы, которая, предположительно, возникла в Испании и распространилась в западной и центральной Европе.

Восточный альпинид

= *горид*.

Восточно-американская умеренная раса

Относительный эквивалент *сильвида* по типологии Агассиса.

Восточно-балтийский тип (*Homo arcticus fennicus* по Серги)

Северо-восточный европейский смешанный тип, результат привнесения и последующей стабилизации *лаппоидного* элемента внутри балтийской популяции. Восточно-балтийский тип представляет собой часть балтийского континуума, противоположную *западно-балтийскому типу*.



**Восточно-балтийский тип
(по Биасутти)**

Восточно-нордический тип

Термин введен Лундманом; восточно-европейский нордический тип, характеризующийся преобладанием элементов типа культуры шнуровой керамики. (см. *культуры шнуровой керамики тип*).



**Русский восточный нордид
(Павел Кашин)**

Восточный веддид

Восточная разновидность *веддида*, относительно более западных разновидностей этого типа, распространенных на Индийском субконтиненте.



Восточный веддид
из Бангладеш

Восточный кроманьид

Тип кроманьида, противоположный *дало-фалиду* ("западный кроманьид"), являющийся основой современных балтийских типов. Одиночные примеры небалтизированных восточных кроманьидов можно обнаружить среди популяций балтийского типа, но это лишь одиночное отображение субстрата; восточные кроманьиды нигде не образуют единой по структуре и характеру популяции. Западно-балтийский тип представляет собой лишь частично балтизированного восточного кроманьида, и составляет значительную долю населения.

Восточный медитерранид

Термин относится ко всем восточным разновидностям медитерранида, включая *пontiда*, которые исторически распространены в восточных районах Средиземноморского бассейна. Также термин иногда употребляется для определения восточно-европейских и центрально-азиатских долихоцефальных брюнетных типов, включая *ориенталидов*.

Восточный сибирид (палео-сибирид)

Разновидность арктического монголоида, отличающаяся более выраженным лицевым профилем, широкой нижней челюстью, менее распространенным эпикантусом, более толстыми губами, мезогнатией, грубыми волосами, узким носом с высокой переносицей, пикническим и массивным телосложением, крайне

развитой мускулатурой, и, как правило, белой кожей. Восточные сибириды распространены на Чукотке и Камчатке. См. *сибирид, западный сибирид*.



Восточный сибирид

Г

Галатийский тип

Специфический французский подтип *суб-нордида*, комбинирующий в себе черты нордида и альпинида.



Галатийский тип
(из Расы Европы К.С. Куна)

Гангид

По типологии Лундмана, разновидность восточного медитерранида, описываемая им как "тип малорослый, очень грацильный, с тонкой, редкой бородой, и высокой частотой гена q".

Ген

Последовательность цепочек ДНК, которые определяют порядок аминокислот в целом протеине или, иногда, в части протеина. Ген может состоять из сотен и тысяч цепочек ДНК, См. *аллель*.

Генерализованный

1) примитивный, схожий с древними чертами; 2) адаптированный к широкому диапазону ресурсов.

Генетика

Наука, изучающая структуру гена и наследование генетических черт от предков к потомкам. Генетические механизмы являются основой эволюционных изменений.

Геном

Полный генетический код индивида или вида. У людей, к примеру, геном достигает приблизительно 3 миллиардов нуклеотидов ДНК.

Генотип

Генетический код индивида. Термин "генотип" может относиться как к генетическому коду индивида в целом, так и к аллелям, занимающим определенное положение в хромосоме. См. *фенотип*.

Геронтоморфный

Характеризующийся физическими чертами, которые наиболее полно проявляются у взрослого мужчины; противоположность *педоморфного*.

Гетеротипный

Представляющий различные типы или формы. См. *гомотипный*.

Гибрид

Потомок смешанного происхождения.

Гибридная зона

Географическая область обмена генами между двумя репродуктивно изолированными родительскими видами, к чему приводит, например, парапатическое видообразование.

Гибридная энергия

Феномен, происходящий, когда новое поколение, родительские группы которого происходили от различных, несмешанных друг с другом популяций, является более здоровым и большим по численности, чем каждая из родительских популяций.

Гипербрахцефальный

Обладающий головным индексом от 85,0 до 89,9; крайне кругло-/коротко-/широколицый.

Гипердолихоцефальный

Обладающий головным индексом от 60,0 до 64,9; крайне длинно-/узкоголовый.

Гиперлатиринный

Обладающий носовым индексом 58,1 или больше; крайне широконосый.

Гиперлептопрозопный

Обладающий лицевым индексом 95,0 или менее; крайне длинно-/узколицый.

Гипсицефальный

Обладающий индексом длина-высота 75 или более; высокоголовый. Явление называется *гипсицефалией*, а индивид с подобным индексом - *гипсицефалом*.

Глоджера закон

Биологический закон, выдвинутый в 1833 году зоологом и орнитологом Константином Вильгельмом Ламбертом Глоджером (1803-1863), согласно которому у теплокровных видов (млекопитающие и птицы) более темнопигментированные формы встречаются ближе к экватору, а менее пигментированные удалены от экватора.

Головной индекс (С.І.)

Максимальная ширина головы*100/максимальная длина головы

Согласно Франкфуртскому соглашению 1882г. (включая дополнение к международному соглашению от 1883):

С.І. 55.0 - 59.9 = ультрадолихоцефальный (крайне узко-/длинноголовый)

С.І. 60.0 - 64.9 = гипердолихоцефальный (очень узко-/длинноголовый)

С.І. - 74.9 = долихоцефальный (узко-/длинноголовый)

С.І. 75.0 - 79.9 = мезоцефальный (голова средней формы)

С.І. 80.0 - = брахицефальный (кругло-/коротко-/широкоголовый)

С.І. 85.0 - 89.9 = гипербрахицефальный (очень кругло-/коротко-/широкоголовый)

С.І. 90.0 - 94.9 = ультрабрахицефальный(крайне кругло-/коротко-/широкоголовый)

Согласно французской системе:

С.І. - 75.00 = долихоцефальный

C.I. 75.01 - 77.77 = субдолихоцефальный

C.I. 77.78 - 80.00 = мезоцефальный

C.I. 80.01 - 83.33 = суббрахицефальный

C.I. 83.34 - = брахицефальный

Введенный Ретциусом, головной индекс играет важную роль в традиционной расологии. Сегодня он реже используется в целях классификации, но его применение синхронно с другими методами и по сей день весьма полезно. См. *черепной индекс*.

Гомоплазия

Сходство между морфологическими чертами, возникающее в результате эволюционной конвергенции. См. *параллелизм*.

Гомотипный

Представляющий один и тот же тип или структуру. См. *гетеротипный*.

Гондид


"Стандартный" подтип *веддида*, распространенный в центральных областях Индии, представленный, в первую очередь, племенем гонди.



Мальчик-гондид

Горид (восточный альпинид)

Восточно-европейский альпиноидный тип с сильным влиянием балтида, более грацильный и высокочерепной. Термин происходит от польского "g?ra" - "гора".

**Горид****Горотелия**

В эволюции, постепенный темп развития. Термин введен Г.Г. Симпсоном. См. *брадителия*, *тахителия*.

Готатип

= *хальштаттский нордический тип* по типологии Лундмана.

Градуализм

Точка зрения, согласно которой эволюция биологических видов - процесс медленный и постепенный, без резких, неожиданных переходов.

Грацильный

Грациозный, стройный, деликатный по сложению, со слабыми мышечными связками или тонкокостный. Противоположность крепкосложенного, дюжего. *Грацилизация*, таким образом, это эволюционная тенденция к большей грацильности.

Грацильный индид

Собственно *индид*, господствующий европеоидный тип индийского субконтинента, который некоторые ученые считают продолжением большого лепто-долихоморфного "пояса" медитерранидов и ориенталидов. Характеризуется низким ростом, долихоцефальностью, высокоголовостью, ортогнатией и высоким, выступающим мезоринным носом. Цвет кожи варьирует от светлого до темно-коричневого, волосы прямые или волнистые, обычно черные, глаза темные.



**Грацильный индид
(по Куну)**

Грацильный медитерранид (*иберо-инсулярный тип по Деникеру; малый медитерранид по Куну; западный медитерранид по Лундману*)

Типичный медитерранид, собственно медитерранид, распространенный на северном берегу Средиземного моря и прилегающих территориях. Характеризуется малым или средним, грацильным скелетом, мезоморфным и маленьким черепом. Грацильные медитерраниды обладают относительно темной пигментацией по сравнению с другими европеоидами (см. *атланта-медитерранид*).



Грацильный медитерранид



Череп грацильного медитерранида

Гюнтер, Ганс Фридрих Карл

(1891-1968) Известный также как "Рассенгюнтер" и "Рассенпапа", Г.Ф.К. Гюнтер был немецким антропологом, внесшим большой вклад в развитие расовых программ немецкого национал-социалистического режима до и во время Второй мировой войны.



Ганс Ф. К. Гюнтер

Д

Далиш

= *дало-фалид* по типологии Паудлера.

Дало-фалид (*далиш* по Паудлеру; *далофэлид*; *дало-нордик* по фон Эйкштедту; *фэлид* по Лундману; *фэлиш* по Гюнтеру; *фалиан/фалид*)

Нередуцированный и депигментированный северно-европейский верхнепалеолитический *кроманьидный* тип, схожий с ирландским *брюнном*. Дало-фалиды преобладают в северной Германии, составляют значительный популяционный элемент в южной Скандинавии (включая *вестманландский* тип по Лундману). Некоторые ученые включают его в обще-нордическую категорию (см. *нордическая раса*).



Дало-фалид
Череп дало-фалида

Дало-нордик


= *дало-фалид* по типологиям фон Эйкштедта и Паудлера.

Данубианский тип

По типологии Куна, низкорослый, мезоринный или хамеринный медитерранидный расовый тип, который, как предполагается, участвовал в формировании нордического типа/типов путем комбинации с *типом культуры шнуровой керамики*.

Дарвин, Чарльз

(1809-1882) Британский натуралист, который обрел мировую славу, предложив мировому научному сообществу теорию эволюции, согласно которой развитие объясняется *естественным и половым отбором*. Данная теория в настоящее время занимает центральное место в биологической парадигме мира.



Чарльз Дарвин

Дарвинизм

Теоретический взгляд на биологическую эволюцию, впервые представленный Чарльзом Дарвином и Альфредом Расселом Уоллесом в 1858 году. Центральным утверждением данной теории является явление *естественного отбора*, согласно которому большие шансы на выживание и продолжение рода имеют те виды, которые сумеют приспособиться к окружающей среде.

Даякид

= *прото-малаид*.

Демография

Анализ размера, состава и процентных изменений внутри популяции.

Дендрограмма

Ветвящаяся или древоподобная диаграмма. Популяции на более близких "ветвях" имеют более близкое родство, чем популяции на взаимноудаленных "ветвях".

Деникер, Жозеф (Иосиф Егорович)

(1852-1918) Русский натуралист/антрополог (французского происхождения), первый ввел термин "нордическая раса" (*la race nordique*). Расовая типология Деникера для Европы включала в себя 10 видов ("этнических групп"), 6 первичных и 4 вторичных.



**Жозеф (Иосиф Егорович)
Деникер**

Депигментация

Уменьшение содержания темного пигмента (*меланина*) в коже, волосах и/или глазах. Последней степенью депигментации является *блондизм*.

Дейтеро-малаид

Подтип *незида* (собственно *незид*), с более прослеживаемыми монголоидными чертами, чем *прото-малаид*.

Динарский тип (динарид; адриатический тип по Деникеру; эпирский тип)

Центрально- и юго-восточный европейский европеоидный тип, названный так из-за связи с Динарскими Альпами. Динарид является *тауридом* по происхождению, продуктом *динаризации* древних популяций неизвестного типа (предполагается, борребидо-подобного кроманьидного типа). Динариды типично брахицефальны, с плоским затылком, длиннолицы, с длинным и выпуклым носом, средне- или темнопигментированы. Они распространены на Балканах, особенно в бывшей Югославии, а своеобразный динаридский "пояс" продолжается от Франции, через южную Германию, Альпы и северную Италию, заканчиваясь на западном побережье Черного моря. См. *норид*.



Динарид (из Расы Европы К.С. Куна)



**Череп динарида
(по Гюнтеру)**

Динаризация

Эволюционный процесс, включающий брахицефализацию, сплющивание затылочной области, развитие длинного и выступающего носа, обычно крайне выгнутого. Динаризация, возможно, является результатом адаптации к жизни в горных районах, и соотносится со скотоводческими популяциями. Евразийские тауридные типы (включающие европейского динарида) - классический пример динаризации, но эта тенденция также прослеживается вне европеоидных групп, к примеру, в некоторых индейских популяциях. Основываясь на наблюдениях антрополога Байрона О. Хьюджеса (докторская диссертация "Физическая антропология коренного армянского населения"), Кун объяснил этот специфический набор черт как результат смешения альпинидов и медитерранидов в определенном процентном соотношении (2/3 медитерранида, 1/3 альпинида; см. "Расы Европы", фотографическое приложение, пример 35). также предполагается, что в процесс динаризации также были вовлечены определенные брахицефализованные кроманьонидные типы.

Динариформный

Подобный или близкий по некоторым характеристикам *динариду*.

Динароидный

Имеющий некоторые динаридные или тауридные черты.

Долихоцефальный

Обладающий головным индексом 74,9 или меньше (75,00 или меньше по французской системе); длинно-/узкоголовый. Явление называется *долихоцефалией*, а индивид с подобным головным индексом - *долихоцефалом*.

Долихокраниальный

Обладающий краниальным индексом 74,9 или меньше; длинно-/узкочерепной.

Долло закон

Гипотеза, выдвинутая в 1890 году палеонтологом Луи Долло (1857-1931), согласно которой черты или функции, которые исчезли в ходе процесса эволюции, не могут проявиться вновь в данном виде.

Доминантность

Способность определенного генетического следа или гена преобладать над так называемым *рецессивным* геном или генетическим следом.

Дравидийский тип

= *веддид* и/или *индо-меланид* по типологии Деникера и др.

Древнегерманский райенгреберский тип

Ширококостная, высокочерепная разновидность нордида железного века (с влиянием кроманьида), представленная в наши дни, к примеру, *англо-саксонским* и *фритерпийским* нордическими типами. В Северной Германии данный тип более распространен, чем собственно нордический.

Е

Евгеника

Философия улучшения расы через принудительную стерилизацию одних популяций и поддерживаемое развитие других.

Евроазиатский тип

По типологии Серги все брахицефальные европеоидные типы; противоположность *евроафриканского типа*.

Евроафриканский тип

По типологии Серги все долихоцефальные европеоидные типы; противоположность *евроазиатского типа*.

Европейская умеренная раса

= *европеоид* по типологии Агассиса.

Европеоид (*кавказская* или *белая раса* по Блюменбаху; *кавказоид*; *европейская умеренная раса* по Агассису; *homo sapiens albus*)

Одна из больших рас человека, распространенная в Западной Евразии и Северной Африке. Наиболее важные подтипы или эволюционные тенденции: *кроманьид* (включая *альпинида*), *индид*, *медитерранид*, *нордид*, *ориенталид* и *таурид*.

Европоид

Близкий к европеоиду, сходный с европеоидом.

Египтид

По типологии Лундмана, разновидность восточного медитерранида, "весьма близкая к *сахариду*, но характеризующаяся большей частотой гена q".

Естественный отбор

Механизм эволюционных изменений, впервые описанный Чарльзом Дарвином; подразумевает генетические изменения или изменения частот определенных аллелей в популяции в следствие различной репродуктивной успешности индивидов. См. *половой отбор*.

Ж

Желтая раса

= *монголоидная раса* (включая *индианидов*) по типологии Блюменбаха.

З

Западный альпинид

= *альпинид*, т.е. его западно-центральноевропейская разновидность, противоположность *горида*; иногда данный термин применяется только по отношению к французским альпинидам.

Западный балтид

Нередуцированный, слегка балтизированный кроманьид (*восточный кроманьид*). Представляет часть балтийского континуума, противопоставляемую *восточному балтиду* (или *лаппоиду*, в более общем смысле). Тип распространен в странах Балтии, в меньшей степени - в Скандинавии и северо-восточной Германии, где постепенно переходит в *дало-фалида* и *борреби*.



Западный балтид
(Валдис Адамкус)

Западно-американская умеренная раса

Относительный эквивалент *пацифида* по типологии Агассиса.

Западный европеоид

= (западный) *альпинид* по типологии Деникера.

Западный медитерранид

= *грацильный медитерранид* по типологии Лундмана.

Западный сибирид

Разновидность арктического монголоида, характеризующаяся выступающим носом, скошенным лбом и более темной пигментацией по сравнению с окружающими группами. По некоторым показателям западный сибирид близок к индианидам. Тип распространен среди жителей Западной Сибири, к примеру, кетов, манси, ненцев, долган и нганасан. См. *сибирид*, *восточный сибирид*.



Западный сибирид

Затылочный бугор

Выступающий бугор затылочной кости. Термин часто используется для научного описания классического неандертальского черепа. Хотя затылочный бугор был широко распространен у ранних людей, в настоящее время он крайне редок. Наиболее часто он встречается среди *австралидов*, *коисанидов* и *лапидов*, и, что весьма интересно, среди европеоидного населения Ланкашира, Великобритания.



**Затылочный бугор
неандертальского черепа
из Маунт Чичеро, Италия.**

И

Иберо-инсулярный тип

= *грацильный медитерранид* по типологии Деникера.

Иконотип

Рисунок или фотография образца типа.



**Иконотип арменида:
слева – фотография, Кун;
справа – рисунок, Лундман**

Индианид (*американская или красная раса* по Блюменбаху; *америнд*; *homo sapiens americanus*)

По сущности монголоидная, но значительно отличающаяся группа, ассоциируемая с коренными американцами. Общая морфология индианидов характеризуется высоким и большим лицом, широкой нижней челюстью, мезогнатией, большим и зачастую орлиным носом, широким ртом, более широкими, чем у азиатских монголоидов глазами, реже встречаемым эпикантусом, большим лицевым профилем чем у азиатских монголоидов, прямыми и иногда слегка волнистыми волосами, слабым ростом волос на лице, очень темной пигментацией волос и глаз, смуглой кожей (обычно бронзового оттенка), типично массивным строением тела, часто высоким ростом, хотя эта черта варьируется. Подтипы: *андид, бразилид, централид, лагид, маргид, пацифид, сильвид*. Индианиды распространены в Северной, Центральной и Южной Америке, на Карибах и близлежащих островах.



**Карта распространения
индианидных типов
(фон Эйкштедт)**

Индид (индо-кавказский тип)

Европеоидная раса Индийского субконтинента. Индиды среднего роста, грацильные и стройные. Они длинноголовые, с длинными и овальными лицами, с плоским лбом и прямым носом, относительно толстыми губами и широкими глазами. Кожа светло-коричневая, волосы черные или темно-коричневые, глаза карие. Подтипы: *грацильный индид* (собственно индид), *северный индид*, *индо-брахид*.

Индо-аборигенный тип

= *веддид*.

Индо-афганская раса

= *иранид* и *северный индид* по типологии Деникера.

Индо-брахид

Брахицефальный, среднего роста тип, распространенный в прибрежных районах Индийского субконтинента. Характеризуется уплощением затылка, высокоголовостью, ортогнатией, коротким и широким лицом, выступающим и часто изогнутым носом. Цвет кожи варьирует от светлого до средне-коричневого, волосы обычно прямые и черные, глаза по большей части темные. Классифицирован фон Эйкштедтом как подтип *индида*.



Индо-брахид

Индо-кавказский тип

= индид.

Индо-меланид

Промежуточный индидо-веддидный тип, распространенный среди дравидийского населения юго-восточной Индии, представленный также среди населения по всему Индийскому субконтиненту. Индо-меланиды короткотелы и длинноноги, с темной пигментацией, длинной головой, обычно мезоринны. Искривление носа и кудрявость распространены среди индо-меланидов, и в целом их строение можно назвать европеоидным, за исключением очень темной кожи. См. *меланид*, *колид*.



Индо-меланид

Ин ситу (in situ)

Натуральное, естественное развитие; к примеру, естественное развитие расовых особенностей.

Инфантильный

Детоподобный (ювенильный). Инфантилизм является следом эволюционного *педоморфизма* у определенных расовых типов, однако термин может применяться и к конкретному индивиду.

Инципиентный монголоид

Расовый тип, который развивался частично в монголоидном направлении, но при этом может иметь иное, немонголоидное происхождение. См. *лаппоид*.


Инципиентный вид

Географически изолированная популяция; со временем накопление генетических различий приводит к возникновению изоляционного механизма, который разделяет репродуктивную способность инципиентного вида и его "родительской" популяции.

Иранид (ирано-афганская раса по Куну)

Относительно высокий, долихо-мезоцефальный, длиннолицый, высокоголовый и клювоносый тип, преобладающий в Иране, Афганистане и прилегающих территориях. По типологии фон Эйкштедта, это подтип *ориенталида*, что связывает его с *арабидом*. Другие относят его к смеси восточного медитерранида

и арабида, но ираниды по своему строению гораздо ближе к медитерранидам и даже нордическим типам (см. *культуры шнуровой керамики тип*), чем к арабидам.



Иранид
(из Расы Европы К.С. Куна,
ирано-афганская раса)

Искусственный отбор

Селекция, проводимая человеком для изменения популяции, к примеру, собак.

Истмид

1) = *централид* по типологии Лундмана; 2) = южный, гипербрахицефальный подтип *централида* по типологии Биасутти.

К

Кавалли-Сфорца, Луиджи Лука

(1922-) Итальянский генетик, один из наиболее влиятельных ученых в этой области. Исследования Кавалли-Сфорца в области человеческой генетики привели его к выводу о том, что строгая расовая классификация является "бесполезной".



Кавалли-Сфорца

Кавказид (мтебид по Лундману)

Высокорослый тип *таурида*, распространенный на Северном Кавказе и близлежащих территориях, возможно, представляющий собой смесь *динарида* и *арменида*. Кавказиды - преобладающий элемент

грузинской популяции, тип также распространен среди чеченцев, ингушей и осетин. Кавказиды - наглядный пример процесса *динаризации*, что, возможно, является результатом адаптации к жизни в горных районах. Не путать с *кавказионным типом/кавказоидом*.



Кавказид

Кавказионный тип

= *европеоид* по типологии Блюменбаха; используется очень часто, наряду с термином "*кавказоид*".

Кавказоид

= *европеоид*; используется очень часто наряду с "*кавказионным типом*".

Калифорнид

Подтип *маргида* (тип *индианида*), по типологии Лундмана.

Капеллид

Любой тип или индивид, схожий с материалом, найденным в Комб-Капелль. Иногда термин используется как синоним *ауригнацида*.

Капоид

= *коисанид*.

Каппадокийский тип

Подтип *медитерранида*, преобладающий в Малой Азии и прилегающих территориях в древности; в настоящее время тип в значительной степени смешан с арменоидами (эта смесь получила название *анатолид*).



Каппадокийский тип
(из Расы Европы К.С. Куна)

Карпатид

Промежуточный динарско-горидный тип, более схожий с *горидом* (кроме большого носа).

Карпентарианский тип

Австралидный подтип, распространенный в центральной и северной Австралии, относительно высокий, прямоволосый и темнокожий, с очень слабым ростом волос на теле. Заметно некоторое сходство с индийскими *веддидами*. Некоторые исследователи относят карпентарианский тип к предполагаемой третьей волне заселения Австралии, после *барринеанского* и *мурраянского* типов.

Каспид

= *восточный медитерранид*; термин применялся Лундманом по отношению ко многим долихоцефальным брюнетным типам, включая *пontiда* и *индида*.

Кафрид (бантуид)

Подтип негрида. Основа - *негрид* с небольшим влиянием *коисанида*, *палеонегрида* и/или *эфиопида* (в зависимости от региона). Данный тип является результатом распространения банту.



Кафрид из Намибии
(по Кнуссманну)

Квинслендский негр

= *барринеанский тип*.

Кельтский нордический тип

Специфический северо-восточный европейский тип, выделенный Куном, названный так в связи с его ассоциацией с кельтскими народами, относительно низкочерепной мезоцефал с выступающим носом, измененный по сравнению с традиционным нордическим типом динарской и другими ненордическими примесями; преобладает в Англии, распространен в странах Бенилюкс.



Кельтский нордический тип
(из Расы Европы К.С. Куна)

Кельтоид

Термин, который ранее использовали норвежские антропологи для определения *страндида*.

Кенневикский человек

9300-летний скелет, найденный в 1996 году на реке Колумбия, в Кенневике. Находка привлекла к себе внимание, главным образом, потому что черепные характеристики кенневикского человека не похожи ни на один из индианидных типов. Предполагалось европеоидное происхождение этого человека, однако последние исследования показали, что он близкородственен с антропологическими типами тихоокеанского региона, особенно с *аинуидом* и *полинезидом*. См. *Люция*.



Череп К.В. - Реконструкция лица

Киангид (тибетид)

1) монголоидный подтип жителей Тибета - смесь по большей части *центрального синида*, *тунгида* (подтипа *кумид*) и незначительных европеоидных элементов.

2) = *центральный синид* по типологии Лундмана (первоначально сам Лундман пользовался термином "центральный синид").

Китаид

Подтип *северного синида*, распространенный в северном Китае.

Кладистика

Подход к классификации, согласно которому эволюционное объяснение базируется на анализе *гомологичных* черт.

Кладогенезис

Эволюция через ответвление.

Кладограмма

График, показывающий эволюционное родство согласно кладистическому анализу. Базируется исключительно на интерпретации гомологичных черт. Время не учитывается, отношение предок-потомок также не включается в график.

Класс

Таксономическая категория, рангом выше *отряда* и ниже *типа*.

Коид

Подтип *коисанида*, распространенный среди нама/готтентотов; характеризуется менее редуцированными чертами и большей негридной примесью, чем *санид*.



Готтентот-коид из Намибии
(по Кнуссману)

Коисаниды (*раса мыса доброй надежды* по Агассису; *капоид*; *homo sapiens hottentotus*)

Одна из больших рас человека; присуща южной Африке, особенно району Калахари. Коисаниды характеризуются низким ростом и *инфантилизмом* в пропорциях тела (их предки - *боскопиды*, были обычного размера). Женщины *стеатопигны*. Лица плоские, с выступающими скулами, носы широкие и плоские, глазницы узкие. Эта последняя черта часто сопровождается эпикантусом, и иногда можно заметить сходство с типами Юго-Восточной Азии. Кожа желтоватая, волосы черные и закручиваются в спирали, глаза темно-коричневые. Иногда выделяют два подтипа коисанидов (*коид* и *санид*).



Коисанид (бушмен)



Череп коисанида

Колид

Индо-меланидный подтип санталов, мунда и других племен северо-востока Индийского субконтинента. Колиды характеризуются средним ростом, долихоцефалией, широкими носами, большими губами, темной кожей и черными кудрявыми волосами.

Комб-Капелль

Скелетные останки, найденные близ Монферран в Перигор, Франция, в 1909 году, датируемые приблизительно 40000 лет до н.э. Характеризуются низким или средним ростом, пятиугольно-эллипсоидным черепом, лептопрозопией, низкими глазницами, прогнатизмом и широким носовым индексом. Комб-капелльский тип часто противопоставляется кроманьидному типу; два этих типа являют собой две тенденции развития европеоидной расы.



Комб-Капелль

Конвергентная эволюция (эволюционная конвергентность)

Эволюция видов различных таксономических групп в одном направлении; развитие схожих черт у организмов разных таксономических групп. См. *гомоплазия, параллелизм*.

Конгоид

= *негрид* по типологии Куна.

Культуры шнуровой керамики тип (культуры боевых топоров тип)

Высокий, лептоморфный, долихоцефальный, длиннолицый и высокоголовый тип западных степей Евразии. Тип к.ш.к. характеризуется стройностью и мускулистостью, надбровные дуги средней величины, нижняя челюсть глубокая, подборок заметный, но узкий. Нос лепторинный и часто выступающий. Термин происходит от ассоциации данного типа с культурой шнуровой керамики; также этот тип являлся основным среди людей культуры боевых топоров на севере. Что касается нордических типов, влияние типа к.ш.к., прослеживаемое особенно в *трондере* и *восточно-нордическом типе* зачастую полностью воссоздает облик древнего типа. Происхождение типа к.ш.к. неясно. Существует теория, согласно которой тип ассоциируется с гаплогруппой R1a Y-хромосомы, которая в значительных количествах распространена от северо-запада к юго-востоку, охватывая Скандинавский полуостров и европейский субконтинент. Следует добавить, что племена преимущественно к.ш.к. типа распространили индоевропейские языки по всей западной Евразии.



**Череп женщины типа к.ш.к.,
Штеттен, 2800-2200 до н.э.**

Коупа закон

Биологический закон, выдвинутый Эдвардом Дринкером Коупом (1840-1897), согласно которому популяции обладают тенденцией к увеличению размера тела с течением геологического времени.

Кошу тип (косю тип по Саллеру; якунинский тип)

Смесь *северного синида* с *палео-монголидом* и *аинуидом*, распространенная в Японии и Корее. Отличается более узким лицом и носом (часто выгнутым), более высоким лбом и менее распространенным эпикантусом, чем соседние синидные популяции.



**Японский дворянин
типа кошу**

Краниометрия

Измерение черепных характеристик человеческих останков. См. *цефалометрия, антропометрия*.

Красная раса

= *индианиды* по типологии Блюменбаха.

Красной королевы принцип

Принцип, выдвинутый в 1973 году эволюционным биологом Лейгом ван Валеном (1935-), согласно которому постоянное развитие необходимо для эволюционной системы, чтобы поддерживать ее способность эволюционировать совместно с другими системами.

Кретшмер, Эрнст

(1888-1964) Немецкий психиатр, известный своими исследованиями, посвященными взаимосвязи строения тела человека и его характера; внес вклад в развитие конституциональной типологии. Выдвинул три основных конституциональных типа: астенический (высокий, стройный), атлетический (мускулистый) и пикнический (округлый), для каждого из которых характерны свои психологические состояния, образцы поведения и отклонения.



Эрнст Кретшмер

Кроманьидный тип

Европеоидный тип, происходящий от крепкостроенного, долихоцефального и широколицего кроманьонца, классический тип охотника/собирателя среднехолодных/холодных регионов. Собственно современный

кроманьидный тип (представленный *дало-фалидом* и *брюнном*) - нередуцированный, немного более грацилизированный и узколицый, чем его верхнепалеолитические предки. Некоторые кроманьидные популяции прошли через различные эволюционные процессы, ведущие к *редукции* и *брахицефализации* (*борреби*, *альпинид* и *балтид*). Случайные примеры небалтизированных восточных кроманьидов иногда встречаются среди населения балтидного типа.

Кро-маньон

Пять первых скелетов этого типа были найдены в 1868 году близ ле-Эизи-де-Таяк, и образец из этих раскопок получил название Кро-маньон I. Останки относят приблизительно к 25000 до н.э. Этот человек был около 170см ростом, и достаточно крепко сложен. Череп довольно большой, долихокраниальный, пятиугольный. Parietalные кости сильно выступают. Лоб прямой, надбровные дуги слегка выступают, черепная коробка значительно сплюснута, а затылочная кость выступает. Глазницы посажены низко, широки и квадратны по форме. Носовой скелет черепа прямой, сильновыступающий. Нижняя челюсть широкая, массивная, с сильноразвитой мускулатурой и довольно выделяющимся подбородком.



Кро-маньон I

Ксантохрои

"Настоящие белые" Северной Европы по типологии Хаксли. Ксантохрои и меланохрои составляют две главных ветви белой ("кавказской") расы по этой (устаревшей) типологии.

Кумид

Подтип *тунгида*, распространенный в Туркестане, Монголии и прилегающих территориях. Кумиды характеризуются низким и широким черепом (иногда выше, чем у *таигида*), высоким и широким лицом, немного менее выступающими скулами, чем у *таигида*, распространенным эпикантусом (все же менее распространенным по сравнению с *таигидом*), высоким и широким носом с легким изгибом. Волосы жесткие и черные, глаза темные, кожа темнее, чем у *таигида*, рост волос на лице слабый, но сильнее, чем у *таигида*.



Мужчина-кумид

Курилид

= *аинуид*.

Л

Лагид

Тип *индианида*. Средне- или высокорослые, долихо-мезоцефальные обитатели горных регионов юго-восточной Бразилии, южного Чили, распространенные также, но в значительно меньшей степени в Аргентине, Парагвае и джунглях Бразилии. Лагиды характеризуются сильно-развитыми надбровными дугами, широким лицом и мощными скулами, отсутствием ясно выраженной плоскости лица. Глазницы узкие, но типично монголоидных черт в строении глаза мало. Нос широкий, прямой или выгнутый, с ясно видимой переносицей, волосы гладкие или волнистые, а кожа светло-коричневая с желтоватым или медным оттенком. Возможно, при формировании лагида участвовали местные австралиформные типы, заселявшие эти территории перед иммиграцией монголоидов. См. *Люция*.



Лагид
(по Гловацкому)

Ладожский тип

= *лаппоид* по типологии Куна.

Лаппид (лаппиш по Куну; скандо-лаппидная раса по Лундману)

Бореализированный, инфантилизованный и гипербрахицефализированный тип лаппоидного происхождения, с небольшим влиянием монголоидов. Тип ассоциируется с населением саами (лопари) северной Скандинавии.



Лаппид (Швеция)



Череп лаппида

Лаппоид (ладожский тип по Куну; уралид)

Частично редуцированный брахицефальный тип восточных лесов, который редко можно найти в его чистой форме, но который представляет значительный субстрат в Восточной Европе, России и странах Балтии (восточно-балтийский тип - более или менее стабилизированная смесь *балтида* и лаппоида). Лаппоидный тип принадлежит к большой верхнепалеолитической группе, и, вероятно, с одной стороны родственен европейским кроманьидам, с другой - монголидам (т.е., как эволюционно промежуточный тип, а не результат смешения).



**Ладожский тип
(из Расы Европы К.С. Куна)**

Лаппоноид

По типологии Чекановского, все редуцированные европейские брахицефалы, включая *альпинида* и *лаппида*.

Леиотричи

Одна из двух "макрорас" по Хаксли, включает в себя "амфинезийскую расу" (*полинезиды*), "американскую расу" (*индианиды*), "меланохрой" (темнопигментированные *европеоиды*), "ксантохрой" (светлопигментированные *европеоиды*), "австралийскую расу" (*австралиды*), "эскимосскую расу" (*эскимиды*) и "монгольскую расу" (*монголиды*). См *улотричи*.

Лептоморфный

Близкий к лептосомному по конституции; противоположность *пикниморфного*.

Лептопрозопный

Обладающий лицевым индексом 90,0-94,9; узко-/длиннолицый.

Лепторинный

Обладающий носовым индексом 47,0 или меньше; узконосый.

Лептосомный

Стройно-сложенный индивид; противоположность *пикнического*.

Либиха закон

Закон, согласно которому в биологической эволюции процессы адаптации и селекции зависят от минимальных возможностей окружающей среды.

Литоральный европейский тип

= *атланта-медитерранид* по типологии Деникера.

Литорид

Смесь *атлантида*, *медитерранида* и *таурида* (арменоид/динароид).

Лицевой индекс

Морфологическая высота лица*100/максимальная ширина лица.

Согласно Мартину:


F.I. - 79.9 = гиперэурипрозопный (очень коротко-/широколицый)

F.I. 80.0 - 89.9 = эурипрозопный (коротко-/широколицый)

F.I. 90.0 - 94.9 = лептопрозопный (длинно-/узколицый)

F.I. 95.0 - = гиперлептопрозопный (очень длинно-/узколицый)

А F.I. 84.0 - 87.9 часто называют мезопрозопным (средние лицевые показатели).



Лептопрозопный Эурипрозопный
(F.I. 93.5) (F.I. 83.5)

Люция (*Lapa Vermelha IV Hominid 1*)

Останки женщины, найденные в 1975 году в Бразилии, но лишь в недавнее время (1995) исследованные. Датируются 12500 - 11500 гг. до н.э. Находка вызвала интерес ученых, поскольку у Люции было обнаружено полное отсутствие монголоидных черт в строении черепа; она более схожа с современными длинноголовыми австралидами и меланезидами. Таким образом, можно заключить, что до вторжения монголоидов в Южной Америке существовала популяция людей с генерализированными плейстоценовыми чертами. Со времени находки Люции в Бразилии было извлечено из под земли более 50 подобных черепов. См. *кенневикский человек*.



Череп Люции



Лицевая реконструкция

М

Малаид

= незид.

Малид

Подтип *веддида*, распространенный во внутренних районах южной Индии. Черты указывают на смесь с негритидом.



Женщина малид

Малый медитерранид

= *грацильный медитерранид* по типологии К.С.Куна.

Маргид (сонорид по Биасутти)

Тип *индианида*. Среднего роста, крепкий долихо-мезоцефал, распространенный в Калифорнии и Сонаре, и (в гораздо меньшей степени) в Мексике, Скалистых горах (шошоны), Флориде и на север вдоль Восточного Побережья вплоть до Ньюфаундленда. Маргиды характеризуются надбровными буграми, широким, но не плоским лицом, маленькими глазницами (без монголоидных черт), средне-широким или широким, выступающим, прямым или выгнутым носом с заметной переносицей, гладкими волосами и коричневой кожей красноватого оттенка. Лундман предложил дальнейшее деление маргида на *калифорнида* и *мексисида*.



Маргид

Мегалитический тип

Доисторический скелетный тип, названный так Куном, в настоящее время в некоторой степени представлен *атланта-медитерранидным* типом.

Медитерранид (вестиш (западный тип) по Гюнтеру)

Парасемья по большей части брюнетных европеоидных типов, всех в большей или меньшей степени долихоцефальных, ортогнатичных, мезо- и лепторинных, узколиких, тонкокостных, со средним размером головы. Медитерраниды могут быть низкого, среднего или высокого роста. Медитерранидная парасемья,

весьма разнородная по своей структуре, включает в себя большинство людей, живущих в "поясе", проходящем с запада на восток от Пиренейского полуострова и южной Италии, через Северную Африку и до Черного моря. Некоторые антропологи включают *ориенталидов* и даже *индилов* в эту весьма расплывчатую категорию. Некоторые наиболее узнаваемые типы медитерранидов это *атланти-медитерранид*, *грацильный медитерранид* и *понтид*. Также термин "медитерранид" зачастую используется лишь по отношению к *грацильному медитерраниду*.

Меланезид (океанический негроид по Куну)

Океанический расовый тип аборигенов Меланезии, предположительно входящий в большую австралоидную группу (однако его связь с *австралидом*, *веддилом* итд. неясна). Меланезидов иногда путают с негридами, однако их сходство весьма отдаленно. Подтипы: *нео-меланезид* и *палео-меланезид*.

Меланид

Тип, схожий (почти подобный) с *индо-меланидом*, со значительной *веддидной* примесью.

Меланин

Темный пигмент, содержащийся в коже, волосах и глазах. Разные уровни содержания меланина являются главной причиной значительных вариаций в пигментации человека. См. *блондизм*, *депигментация*.

Меланохрои

"Темные белые" из Северной Африки, Южной Европы и Индии по типологии Хаксли. Меланохрои и ксантохрои составляют две главных ветви белой ("кавказской") расы, согласно его устаревшей системе.

Менделизм

Система принципов наследования, сформулированная Менделем и являющаяся основой генетики.

Мендель, Грегор Иоганн

(1822-1884) Монах-августинец, работы которого показали, что процессы наследования у живых организмов протекают по определенным законам (известным позже как "законы Менделя"). Мендель широко известен как "отец генетики", а его исследования наследственности стали основой возникновения этой дисциплины.



Грегор Иоганн Мендель

Мезогнатичный

Обладающий слегка выдающимся лицевым профилем, с углом 80-84,9 градусов.

Мезокраниальный

Обладающий черепным индексом от 75,0 до 79,9; череп среднего размера.

Мезоморфный

Средний по сложению между *лептоморфным* и *пикниморфным*.

Мезопрозопный

Обладающий лицевым индексом от 84,0 до 87,9; лицо средней формы.

Мезоринный

Обладающий носовым индексом от 47,1 до 51,0; со средними пропорциями носа.

Мезоцефальный (мезатицефальный)

Обладающий головным индексом от 75,0 до 79,9 (77,78-80,00 по французской системе); голова среднего размера. Явление называют *мезоцефалией*, а индивида с подобным головным индексом - *мезоцефалом*.

Мексицид

Разновидность/подтип *маргида* по типологии Лундмана.

Минкопис

= *андаманид* по типологии Хаксли.

Монголид (*homo sapiens asiaticus*; монгольская или желтая раса по Блюменбаху (включая индианидов))

Одна из больших рас человечества; характеризуется по большей части низким ростом, пикническим сложением, короткими ногами, плоским лицом, выступающими скулами, высокими глазницами, орто- или мезогнатией (последняя, как правило, является результатом альвеолярного прогнатизма), узкими глазами (с эпикантусом, но не всегда), обычно приплюснутым и вогнутым (но иногда прямым и даже выгнутым) носом, полными губами. Зубы характеризуются *синодонтией*. Рост волос на лице и теле очень слабый, волосы на голове обычно прямые, иногда слегка вьющиеся, от черных до очень темно-коричневых по цвету. Глаза темные, а цвет кожи варьирует от очень светлого до смуглого. Монголиды распространены в Сибири (*сибирид*), Чукотке и Камчатке, Туркестане, Монголии (*тунгид*), Маньчжурии, Корее, Японии, Китае (*синид*), Тибете, Непале, на Индийском субконтиненте, в Бирме, Индокитае (*палео-монголиды*, частично немонголоидны), Тайване, Филиппинах, Малайзии, Индонезии, Океании, Мадагаскаре, Северной Америке, Южной Америке и близлежащих островах (*индианиды*, весьма отличающиеся от азиатских монголоидов)



**Череп монголида
(мужской)**

Монголоид

Близкий или родственный *монголиду*; характеризующийся специфическими монголоидными чертами.

Монтадон, Жорж

(1879-1944) Французский антрополог. Известен тем, что во время нацистской оккупации обеспечивал сертификаты "арийскости", а также утверждал, что имеет доказательства существования огромной человекоподобной обезьяны в джунглях Южной Америки.



Жорж Монтадон

Морфологические черты

Неметрические, доступные для наблюдения специфические черты человеческого тела.

Морфология

Ветвь биологии, занимающаяся изучением форм и структур организмов, без определения их назначения и функций. Также термин "морфология" часто употребляется по отношению к формам конкретного организма (=фенотип).

Морфотип

Морфологически различная часть популяции одной и той же таксономической единицы. См. *фенотип*.

Мтебид

= *кавказид* по типологии Лундмана; термин происходит от грузинского *мтеби* - "гористая местность".

Мультирегиональная гипотеза

Гипотеза, согласно которой *homo sapiens* появился независимо в нескольких регионах от различных групп *homo erectus*. См. *африканского происхождения гипотеза*.

Мурраянский тип

Австралидный подтип более тяжелого и крепкого вида, характеризующийся светло-коричневой кожей, волнистыми волосами и значительным ростом волос на теле. Подмечено сходство этого типа с аинуидами Японии. Некоторые исследователи относят мурраянов ко второй волне расселения австралийских аборигенов (первой был *барринеанский тип*). Тип этот сохранялся в бассейне Муррея на восточном, южном и западном берегах во времена заселения Австралии европейцами.

Мутация

Изменение в структуре гена, вызванное внешним влиянием.

Мыса Доброй Надежды раса

= *коисаниды* по типологии Агассиса.

Н

Негрид (*африкоид; конгоид по Куну; эфиопийская или черная раса по Блюменбаху; негроид; homo sapiens afer*)

Одна из больших рас человечества, распространенная в Африке. Негриды характеризуются долихоцефалией (кроме *палео-негридов* и *бамбутидов*), прогнатизмом, темно-коричневой кожей (иногда

баклажанного цвета), курчавыми черными волосами. Существует целый набор подтипов негрида, включающий *суданида*, *палео-негрида*, *нилотида*, *бамбутида*, *кафрида* и *эфиопида*.



**Череп негрида
(мужской)**

Негрильо

Африканский пигмей, см. *бамбутид*.

Негритид (азиатский пигмей)

Тип так называемых негритосов, малорослых, темнокожих аборигенов Юго-Восточной Азии. Негритиды распространены на Филиппинах (*аэта*), Андаманских и Никобарских островах (*андаманид*), Малайском полуострове (*семанг*), и в некоторых других областях. Предположительно, они являются потомками самых первых *homo sapiens*, поселившихся в Юго-Восточной Азии.



**Негритос из Самбалес
(Филиппины)**

Негроид

Близкий или родственный *негриду*.

Незид (малаид)

Разновидность *палео-монголида*, распространенная на островах Юго-Восточной Азии. Незиды распространены на Малайском архипелаге. Подтипы: *дейтеро-малаид*, *прото-малаид*. См. *палангид*.



**Балийские девушки незидного типа
(по Фогелю)**

Неоданубианский тип (*ориенталь* по Деникеру)

Согласно Куну, брахицефальная, депигментированная смесь *лаппоида* (*ладожского типа* по его типологии) и данубиана (*медитерранида*), распространенная среди жителей Восточной Европы.

Нео-меланезид

Подтип *меланезида*, представленный среди аборигенного населения Новой Гвинеи. Нео-меланезиды среднего роста, стройные и крепкостроенные, с мезоцефальными головами и длинными лицами, высоким, зачастую выгнутым, достаточно широким носом с продолговатым кончиком, со средне-широкими губами. Кожа темная, волосы темные и курчавые ("негроидные"), глаза карие. Рост волос на лице и теле значительный. Нео-меланезиды преобладают в Новой Гвинеи, среди папуасов. См. *палео-меланезид*.



**Нео-меланезид из
Папуа Новой Гвинеи**

Нео-монголид

Менее распространенный термин, употребляемый по отношению к *тунгидам* и *северным синидам*, в противоположность *палео-монголиду* Юго-Восточной Азии. Нео-монголиды сохранили большинство настоящих монголидных черт, приобретенных в результате адаптации к холодному климату во время последнего ледникового периода.

Неотения

Эволюционный процесс, при котором физиологическое развитие замедлено или отстает, результатом чего является *педоморфизм*.

Нилотид

Подтип *негрида*, с частичным влиянием *европеоида*, ассоциируемый с областями вокруг верхнего течения Нила. Тип чрезвычайно высок и длинноног, с длинным и узким черепом, довольно длинным лицом, грацильными чертами. Расстояния между глазами небольшое, нос узкий, прямой, с высокой переносицей, с характерной негридной уплощенностью ноздрей, однако не сильной. Губы тоньше, чем у большинства типичных негридов (к примеру, *суданидов*), прогнатизма нет. Подбородок нилотида сильно развит, уши маленькие. Кожа очень темная.

**Юноша-нилотид****Ново-голландская раса**

= *австралид* по типологии Агассиса.

Нордальпиноид

= *борреби*.

Норд-атлантид (северо-западный тип по Деникеру)

По большей части нордическая (*кельтский нордический тип*) смесь с *атланти-медитерранидом*. Норд-атлантиды, как правило, темноволосы и светлоглазы. Тип составляет значительный популяционный элемент на Британских островах, особенно в Уэльсе.

**Норд-атлантид****Нордид (нордик)**

Группа сильно депигментированных северо-европейских долихо-мезоцефальных лептоморфов, схожесть которых частично является результатом общего происхождения, а частично - *конвергентной эволюции*. Существует три основных узнаваемых нордических типа: классический *хальштаттский нордический тип*, северо-западный *кельтский нордический тип* и восточно-европейский *восточный нордический тип*.



Нордический череп

Нордизация

Эволюционная тенденция в нордическом направлении. Популярный термин с малой практической значимостью.

Нордиформный

Близкий или родственный нордиду по некоторым показателям.

Нордическая группа

Северо-европейская пара-группа *кроманьидов* и *нордидов*, по большей части высоких и депигментированных, живущих в относительном пересечении. Группа не представляет собой филогенической общности.

Нордоид

Схожий или родственный *нордиду*.

Нордо-медитерранид

См. *атлантид*.

Норд-понтид

Иногда используется по отношению к нордид-понтидным смесям, распространенным, к примеру, среди украинского населения.

Норид (суб-адриатический тип по Деникеру)

Нордид, измененный в результате смешения с *динаридом*. Термин "норик" был введен Лебцельтером. Нориды преобладают в Австрии, а также распространены в Северной Франции и прилегающих областях. Кун, который считал норидов депигментированными медитерранидами, утверждал, что для формирования нориды не обязательно было наличие динарской примеси, и к возникновению типа привела *динаризация* депигментированного медитерранидного населения..



Норид
(Каринтия)

Носовой индекс (N.I.)

Ширина носа*100/высота носа

Согласно Франкфуртскому соглашению:

N.I. - 47.0 = лепторинный (узконосый)

N.I. 47.1 - 51.0 = мезоринный (нос средней ширины)

N.I. 51.1 - 58.0 = платиринный (широконосый)

N.I. 58.1 - = гиперплатиринный (крайне широконосый)

Согласно Брока:

N.I. < 48 = лепторинный

N.I. 48 - 53 = мезоринный

N.I. 53 - 58 = платиринный



Носовой индекс

О

Оберкассель

Скелетные останки, найденные в 1914 году в Оберкассель, недалеко от Бонна (Германия). Ростом "оберкассель" был около 170см. Череп, который можно назвать кроманоидным, большой, долихо- и ортокраниальный, с округлой затылочной костью. Лицо низкое, надбровные дуги выступают,

бизигматический диаметр огромен. Подбородок выступает, прогнатизма нет. При жизни нос оберкасселя был лепторинный и клювоподобный.



Оберкассель

Океанический негроид

Термин, использовавшийся Куном ("Происхождение рас", 1962) для описания типа (типов) *меланезида*.

Ориенталид

Ближневосточный/центральноазиатский европеоидный тип, включающий в себя южный подтип - *арабидов*, и северный - *иранидов* (по типологии фон Эйкштедта). По некоторым системам термин синонимичен термину "арабид". Карлтон Кун и др. относили эти типы к медитерранидам.

Ориенталь

По типологии Деникера (*race orientale*) восточно-европейский брахицефальный расовый тип, который Кун называл *неоданубианским*.

Оркдальский тип

Специфический фенотип, ассоциируемый с центрально-скандинавской разновидностью *трондера*, поименованной по названию норвежской деревни Оркдаль. Тип является примером преобладания черт *типа культуры шнуровой керамики*.

Ортогенезис

Ошибочная теория, согласно которой вид развивается в строго определенном направлении из-за наличия некоторой врожденной силы, принуждающей его делать это.

Ортогнатичный

Прямочелюстной, с углом 85-89,9 градусов.

Остеология

Наука, занимающаяся изучением скелетного материала.

Остердальский тип

= *хальштаттский нордический тип* по типологии Брюна.

Остеуропид

= *балтид* (включая *восточного балтида* и даже *лаппоида*) по типологии фон Эйкштедта.

Остиш ("восточный")

= *альпинид* по типологии Гюнтера.

Острова закон

= *Фостера закон*.

Островной лиллипутизм

Биологический феномен, заключающийся в том, что размер животных, изолированных на острове, крайне быстро сокращается с каждым поколением. См. *Фостера закон*, *островной гигантизм*.

Островной гигантизм

Биологический феномен, заключающийся в том, что размер животных, изолированных на острове, крайне быстро увеличивается с каждым поколением. См. *Фостера закон*, *островной гигантизм*.

Отбор

= *естественный отбор*.

Отряд

Таксономическая категория организмов, рангом выше *семейства* и ниже *класса*.

П**Палангид**

Разновидность *палео-монголида*, распространенная в континентальных частях Юго-Восточных Азии. См. *незид*.



**Вьетнамский палангид
(по Кнуссману)**

Палеоантропология

Интердисциплинарная наука, занимающаяся изучением ранних гоминидов - их хронологии, физических черт, археологических останков, образа жизни итд.

Палео-атлантид

Сводный, обобщенный термин, введенный Лундманом для определения сильно пигментированных европейских кроманьидов/кроманоидов. Одним из примеров палео-атлантида является скандинавский *тюдальский тип*. Подобный тип заселяет часть Шотландии. Палео-атлантиды не составляют значительного популяционного элемента ни в одной современной северо-европейской популяции.

Палеовид

Группа схожих останков, которые предположительно относились к одному виду, поскольку степень их морфологических различий не больше, чем степень морфологических различий внутри любого современного вида.

Палео-индид

Редко используемый термин, которым называют веддидные и меланидные (индо-веддидные) элементы в популяциях Индийского субконтинента.

Палео-меланезид

Подтип *меланезида*, преобладающий среди аборигенного населения Меланезийского Архипелага, особенно в Новой Каледонии. Палео-меланезиды среднего роста, пикниморфны. Головы низкие и мезоцефальные, лица низкие, с грубыми чертами, с широкими и мясистыми носами, большими ртами с толстыми, но не выступающими губами, выступающими подбородками, глубоко посаженными глазами. Кожа темная, волосы черные и спиралевидные, глаза карие. См. *нео-меланезид*.



**Палео-меланезид из Новой Каледонии
(по Кнуссману)**

Палео-монголид (аустрид; тропическая азиатская раса по Агассису)

Педоморфно-инфантильный, по большей части монголидный тип Юго-Восточной Азии. Палео-монголиды впитали в себя некоторое количество веддидных, австралидных и негритидных черт. Они характеризуются низким ростом, низким и круглым лицом, широким носом, полными губами, неразвитым подбородком, относительно редко встречающимся эпикантусом. Подтипы: *незид, палангид*.



Палео-монголид

Палео-негрид

Подтип *негрида*. Редуцированный продукт смешения между *негридами* и *бамбутидами*. Палео-негриды характеризуются средними или малым ростом, относительно длинным туловищем, короткими руками и ногами, широким сложением, короткой шеей и маленькими ладонями и стопами. Голова круглая и относительно брахицефальная, с выступающей или слегка округлой затылочной костью. Лицо широкое и относительно низкое - у мужчин зачастую квадратное, а у женщин более округлое. Зигматические дуги выступают, нос маленький, широкий, с низкой переносицей и мясистыми, округлыми ноздрями, челюсть прогнатична, подбородок слабо развит, губы толстые. Рост волос на лице и теле сильнее, чем у других рас. Волосы плотные, вьющиеся, короткие и черные. Кожа толстая, темно-коричневая, губы голубовато-красные. Глаза темно-коричневые.



Палео-негрид

Палео-сардинский тип

= *берид* по типологии Биасутти.

Палео-сибирид

= *восточный сибирид*.

Пальпация

Прощупывание при помощи пальца или пальцев для определения положения анатомически значимых точек.

Памирид (центрально-азиатский междуречный тип; памиро-ферганский тип по Ярکو; памиро-ферганид)

Согласно типологии фон Эйкштедта, памириды являются относительно несмешанной европеоидной разновидностью *туранида* (в противоположность монголоидным туранидам, названным *аралидами*). Они крайне брахицефальны (индекс больше 85), по некоторым чертам - *альпиноиды*, по другим - *тауриды* (затылочная кость, тем не менее, чаще выгнутая, а не плоская). Памириды составляют основной расовый тип таджиков.



Памирид
(туранид по Гловацкому)



Череп памирида (туранида)
(по Лундману)

Памиро-ферганский тип

= *памирид* по типологии Ярко (1933).

Пампид (патагонид)

Подтип *индианида*. Высокого или очень высокого роста, широкосложенный, крепкий мезо-брахицефал, распространенный на равнинах Патагонии и пампасах Гран Чако. Пампиды характеризуются надбровными буграми, большим, прямоугольным, заметно плоским лицом, узкими глазами с заметными "индейскими складками". Нос прямой, узкий или средне-широкий. Волосы гладкие, кожа средне- или светло-коричневая, с оливковым оттенком.



**Девочка пампид
из племени Селькнам/Она**

Параллелизм (параллельная эволюция)

Сходное эволюционное развитие различных видов после разделения от общего предка, у которого были зачатки анатомических черт, приведшие к этому. Параллелизм, как считается, присущ самостоятельным видам при ощущении ими сходного эволюционного давления в течение *естественного отбора*. См. *конвергентная эволюция, гомоплазия*.

Парапатрическое видообразование

"Способ" видообразования, при котором популяция рассеяна на большой географической территории, с уменьшенной возможностью генетического обмена внутри популяции, что приводит к возникновению гибридных зон между репродуктивно обособленными видами.

Парафилетическая группа

Набор видов, включающий древний вид вместе с некоторыми, но не всеми, потомственными видами. Виды включаются в группу, если они отображают те же черты, что и предок; виды, которые исключаются, значительно изменились и не походят более на своего предка.

Патагонид

= *пампид*.

Пацифид (западно-американская умеренная раса по Агассису (почти синонимично))

Тип *индианида*. Среднего или высокого роста, крепкостроенный брахицефал, распространенный вдоль западного побережья Канады, в восточной Аляске, а также в северо-западных частях США и вдоль Рио Гранде (навахо, апачи). Пацифиды характеризуются широким, прямоугольным лицом, отсутствием монголидных черт глаз, средне-широким прямым или выгнутым, выступающим носом, гладкими или слегка волнистыми волосами (иногда депигментированными), средним ростом бороды и волос на теле, светло-коричневой кожей.




**Пацифид из племени навахо
(по Кнуссману)**

Педоморфизм

Сохранение юношеских (детских) физических черт во взрослом возрасте. *Неотения* - эволюционный процесс, включающий в себя педоморфизм. Педоморфичные (педоморфные) черты у женщин являются притягательными для большинства мужчин.

Пепельно-светлый оттенок волос

Тип блондизма, при котором полностью отсутствует рыжина; пепельно-светлые волосы выглядят серыми или "платиновыми".



Переднеазиатский тип (vorderasiatischer typus)


= *арменид* по типологии Гюнтера.

Перипатрическое видообразование

= *периферийной изоляции видообразование*.

Периферийной изоляции видообразование

Форма аллопатрического видообразования, при котором новые виды формируются в малых популяциях, изолированных у самых границ географического ареала распространения древней, родительской популяции.



**Периферийной изоляции
видообразование**

Пигмид

1) = *бамбутид* ("африканский пигмид"); 2) = *негритид* ("азиатский пигмид").

Пигмей

1) Индивид необычайно маленького размера; 2) африканский пигмей, т.е. *бамбутид* (негрильо, африканский пигмид).

Пикниморфный

Близкий по конституции *пикническому*. Противоположность *лептоморфного*.

Пикнический (эндоморфный по Шелдону)

Коренастый индивид (противоположность *лептосомного*). Кретшмер предполагал, что пикнические люди более склонны к развитию маниакально-депрессивных отклонений.

Планид

Западная разновидность *сильвида*, преобладающая в центральных и северо-центральных районах Северной Америки (Дакота и др.). См. *аппалачид*.

Платиринный

Обладающий носовым индексом от 51,1 до 58,0; широконосый.

Плезиоморфный

= *примитивный*. См. *апоморфия*.

Подвид

Таксономическая категория рангом ниже *вида*, показывающая эволюционные тенденции его развития; подвиды различаются морфологически, существует небольшой процент генетического обмена между ними, но нет репродуктивной изоляции. Современные *расы* человека являются подвидами вида *homo sapiens*.

Позиционная плагиоцефалия

Уплотнение затылочной кости, результат размещения головы ребенка на жесткой поверхности, например, на колыбельной доске. См. *положение в колыбели*.

Полинезид (амфинезийская раса по Хаксли; тихоокеанская раса по Агассису)

Первичный расовый тип островов Тихого Океана. Полинезиды высокие и крепкостроенные, со средне-высокими, слегка угловатыми лицами, относительно широкими губами и носами, широкими глазницами. Кожа светло-коричневая, волосы волнистые и черные, глаза темно-карие. Тип преобладает на Гавайях, Самоа, Тонга, Новой Зеландии, Островах Содружества, Острове Пасхи. В Микронезии тип в значительной степени смешан с *меланезидами* и *палео-монголидами*.



Полинезид (по Гловацкому)

Политипичный вид

Таксономическая единица, включающая в себя несколько подчиненных подединиц. Политипичным видом является вид, проявляющийся в двух или нескольких формах (расах или подвидах), например, регионально различающийся *homo sapiens*. См. *рассенкрайс*.

Полифилетическая группа

Набор видов, происходящих от более чем одного общего предка. Последний общий предок всех видов полифилетической группы не включается в нее.

Полицентризм

Теория Франца Вейденрейха, подразумевает существование нескольких центров эволюции человека, связанных между собой сетью генетического обмена.

Половой диморфизм

Наследственные различия в морфологии между индивидами различного пола внутри одного и того же вида, расы или подтипа. Половой диморфизм у людей заключается в различиях в росте, развитии мускулов, крепости сложения. Чем больше половой диморфизм, тем больше различия.

Половой отбор


Тип *естественного отбора*, который осуществляется только в пределах одного пола внутри вида. Является результатом борьбы за партнера для спаривания и приводит к *половому диморфизму* с приобретением одной или более черт.

Положение в колыбели

Практика, распространенная, к примеру, среди северо-американских индейцев, расположения детей в жестком креплении с колыбельной доской, что служит причиной уплощения затылка. См. *аннулярное сжатие*, *позиционная плагиоцефалия*.

Понтид (черкесский тип)

Подтип *медитерранида*. Понтиды в большой концентрации распространены в Юго-Восточной Европе (Балканы, южная Румыния, Украина) и преобладают в регионах, прилежащих к Черному морю (включая часть Кавказа), по названию которого Бунак и поименовал тип (понтик; древние греки называли Черное море "понтос" - "море"). Понтиды высокого роста (но не такие высокие, как *атланта-медитерраниды*), достаточно грацильны, со сглаженными чертами лица, характеризуются высоким черепом, узким лбом, немного узким разрезом глаз, и более светлой пигментацией, чем медитерраниды в целом. См. *норд-понтид*.



**Понтид
(Болгария)**

Популяция

Группа индивидов, способных к репродукции.

Препонтид

Согласно типологии Лундмана, экстраординарно долихоцефальный расовый тип, который предположительно вымер, однако его следы можно обнаружить на Балканах.

Примитивный (плезиоморфный; протоморфный)

Относящийся к черте или комбинации черт, характерных для древней формы. См. *прогрессивный*.

Прогнатичный

Обладающий выступающей челюстью, с углом до 79,9 градусов. *Негриды, австралиды и веддиды* являются примерами наибольшего прогнатизма среди современных людей.

Прогрессивный

В физической антропологии, *прогрессивный* - относительный термин, употребляемый как антоним *примитивного*; прогрессивные черты представляют собой эволюционно измененные (причем значительно) черты по сравнению с древней формой, и по сравнению с чертами, которые более близки к древней форме (= "примитивные черты").

Прото-малаид (даякид по Лундману)

Подтип *незида (палео-монголида)*, ассоциируемый в первую очередь с народом даяков острова Борнео. Прото-малаиды смешаны с *веддидами, меланезидами и негритидами*, и сохранили меньше монголидных черт, чем *дейтеро-монголиды*.

Протоморфный

= *примитивный*.

Пршедмост

Несколько черепов *ауригнацидов*, найденные в Пршедмосте, Моравия (Словакия). Датируются примерно 25000 до н.э., одна из наиболее ранних находок современного человека. Череп широкие и крепкие, и, как считается, эти черты показывают как происхождение от неандертальца, так и от *homo sapiens*.



Пршедмост 3



Пршедмост 4

Пуэблид

Северная разновидность *централида* по типологии Биасутти.

Р

Раса

Термин, по большей части синонимичный с термином "*подвид*".

Расизм

Концепция, согласно которой одна *раса* превосходит другие.

"Расы Европы"

Монументальная монография по физической антропологии, опубликованная в 1939 году Карлтоном С.Куном, адъюнкт-профессором антропологии Гарвардского университета. Более чем 700-страничная работа является своего рода продолжением классического труда Уильяма З. Рипли под тем же названием.

Рассенкрайс (Rassenkreis)

Политипический вид, т.е. вид, "составленный" из рас или подвидов. Термин введен последователем неodarвинизма, орнитологом Бернхардом Реншем.

Редукция

Эволюционный процесс, в результате которого потомство приобретает меньшие размеры, чем его предки, и имеет меньшие пропорции (иногда сопровождается процессом *инфантилизации*). *Бамбутиды* (пигмеи) - пример наиболее сильной редукции.

Рекомбинация


Генетическое объединение черт, первоначально ассоциируемых с различными родительскими линиями.

Репродуктивная изоляция

Неспособность популяции одного вида смешиваться с другим видом, нормальное явление для биологического вида.

Ретциус Андерс

(1796-1860) Известный шведский профессор анатомии; его исследования человеческого черепа и его измерений привели к возникновению концепции головного индекса и классификации на брахицефалов и долихоцефалов; открытие это является одним из важнейших для физической антропологии.



Андерс Ретциус

Рипли, Уильям З.

Американский антрополог. Отказался от типологической системы Деникера (но принял его термин "нордик"), и ввел трехчленную типологическую систему рас Европы, представленную *нордической (тевтонской), альпийской и медитерранидной* расами. Согласно Рипли, *альпийская раса* является основной европейской расой, которая сформировалась в Азии еще до заселения Европы и от которой позже произошли нордическая и медитерранидная (средиземноморская) расы. Прежде всего Рипли известен благодаря своему труду "Расы Европы" (1899), в котором он привел свою типологию используя антропометрические данные.

Род

Таксономическая категория, рангом ниже *семейства* и выше *вида*, в основном состоящая из группы видов со схожими признаками.

Ромера закон

Обобщающее правило, согласно которому адаптация к новой среде обитания зачастую является результатом эволюционных изменений, которые должны были служить для приспособления вида к его старой среде обитания.

С

Саволаксид

Согласно Лундману, наиболее восточный из двух *восточно-балтийских* подтипов (другим подтипом является *тавастид*).

Санид

Бушменский подтип *коисанида*, характеризующийся более редуцированными и инфантильными чертами и меньшей негридной примесью, чем *коида*.



Женщина санид
(по Кнуссману)

Сахарид (южный медитерранид)

Высокий, грацильный, высокочерепной медитерранидный тип, распространенный на юге Пиренейского полуострова и в Северной Африке.



Сахарид
(По Лундману)

Северный индид (индо-афганский тип по Деникеру; нординдид)

Северо-западный подтип *индида*, характеризующийся относительно высоким ростом, долихоцефалией, высотой головы гораздо меньшей, чем у грацильного индида, длинным, выступающим и лепторинным

носом. Цвет кожи варьирует от розово-белого до светло-коричневого, волосы прямые и варьируют по цвету от орехового до темно-коричневого, цвет глаз - от серо-голубых до светло-карих. Морфология северного индида характерна для сикхов и брахминов, а тип в целом является переходным к *ираниду*.



Северный индид

Северный синид (хоид по Лундману)

Подтип *синида*. Северные синиды характеризуются относительно высоким ростом, узкими лицами и носами, низким головным индексом, высоким индексом высота-длина, средним содержанием подкожного жира, относительно светлой пигментацией. Северные синиды распространены в северном Китае (*китаид*) и Корее (*чосонид*).



Северный синид (из Лексикона Фишера)

Северо-западный тип

По типологии Деникера голубоглазый, темноволосый элемент в ирландской популяции, который, как он предполагал, принадлежит к атланти-медитерранидному типу. Этот термин в большей или меньшей степени синонимичен термину "*норд-атлантид*".

Семанг

Негритос (представитель *негритидной расы*) Малайского полуострова, характеризующийся ростом менее полутора метров, круглой или средней головой, низким округлым лбом, который нависает над переносицей, коротким, сдавленным пирамидообразным носом, средними или толстыми губами, слабо развитым подбородком, часто слабо выступающими челюстями. Глаза темно-коричневые, широко открытые и круглые, не косят. Волосы темно-коричневые (почти черные), с тугими кудрями, кожа черная или очень темно-коричневая. См. *азта*, *андаманид*.



**Женщина-семанг
негритидного типа**

Семейство

Таксономическая категория родственных организмов, рангом ниже *отряда* и выше *рода*. Семейство обычно состоит из нескольких родов.

Сибирид

Арктический монголидный тип, распространенный в Сибири, подразделяется на *восточного сибирида* и *западного сибирида*.

Сильвид (восточно-американская умеренная раса по Агассису (почти синонимично))

Тип *индианида*, названный так фон Эйкштедтом. Высокие и крепкостроенные мезоцефалы, распространенные в лесистых районах восточной Канады, Аппалачах (делавары, могикане, ирокезы) и прериях Среднего Запада (Дакота). Сильвиды характеризуются удлиненным, прямоугольным лицом с заметной плоскостью, очень выступающим, узким или средне-широкими выгнутым носом, иногда орлиным профилем (Лундман описывал этот тип как "динариоморфный", т.е. *динариформный*). Веки узкие, скошенными краями, часто встречается эпикантус (особенно у женщин и детей). Волосы гладкие, кожа - от светло-коричневой до темно-коричневой с желтоватым, красноватым или медным оттенком. Существует два подтипа сильвида: восточный - *аппалачид*, и западный - *планид*.



Сильвид (по Гловацкому)

Симпатрическое видообразование

Эволюция репродуктивно изолированных популяций (*видов*), заселяющих одну и ту же территорию.

Симплезиоморфия

Явление, когда типично *примитивные* (плезиоморфные) черты присущи сразу двум или более таксономическим единицам. Совместное обладание симплезиоморфными чертами не говорит о том, что таксономические единицы родственны.

Синаморфия

Явления, когда *апоморфными* чертами обладают две или более таксономические единицы. Если две единицы обладают чертой, которая не является примитивной, вероятнее всего они взаимосвязаны эволюционно, и лишь синаморфные черты могут служить доказательство того, что таксономические единицы родственны. Древо классификации создается на основании группирования таксономических единиц с синаморфией.

Синид

Наиболее многочисленная разновидность *монголида*, характеризующаяся высоким и узким черепом и лицом (однако лицо ниже, чем у *тунгида*), мезогнатией, частыми случаями эпикантуса, жесткими и прямыми черными (иногда с синим отливом) волосами, более темной кожей и толстыми губами, чем у *тунгида*. Синиды распространены в Китае, Тибете, Корее. Подтипы: *северный синид*, *центральный синид*, *южный синид*.

Синодонтия

Монголидный тип зубов, характеризующийся лопатообразными резцами, верхними первыми премолярами с одним корнем и нижними первыми молярами с тройным корнем. Противоположность *сундадонтии*.

Сирид

По типологии Лундмана подтип *арабида* "с меньшей частой гена r".

Скандо-лаппидная раса

= *лаппид* по типологии Лундмана.

Скандонордид

= *хальштаттский нордический тип* (готский тип в более общем смысле) по типологии Лундмана.

Смешанная наследственность

Исторически влиятельная, но фактически ошибочная теория, согласно которой организм содержит смесь наследственности своих родителей, и передает эту смесь своим потомкам. См. *теория наследственности Менделя*.

Сонорид

= *маргид* по типологии Биасутти.

Стазис

Малые эволюционные изменения в течении длительного периода времени или полное отсутствие таких изменений.

Стеатопигия

Отложение жира в ягодицах, характерное для *коисанидов* и *андаманидов*, распространенное также среди *бамбутидов*. Это типично женская черта, однако, в меньшей степени, это встречается и у мужчин.



**Стеатопигия
у женщины**

Страндид (кельтоид)

Редуцированный, *инфантилизованный*, сильнопигментированный (кареглазый, почти черноволосый и немного смуглый) брахицефал (индекс 83), распространенный на западном побережье Норвегии (особенно в северо-западных провинциях, с максимальной концентрацией в Суннморе). Страндиды типично эурипрозопны, с мезоринными, вогнутыми носами. Если судить по их чертам, они, несомненно, являются продуктами *альпинизации* (возможно, локальной), но действительное происхождение типа не удастся проследить из-за отсутствия сходного скелетного материала. Индивиды этого типа немногочисленны, часто смешаны с локальными *борреби*, так что иногда считается, что страндиды являются просто более альпинизированной и законченной формой более высокого и крепкого брахицефала *борреби*. Однако эта теория не объясняет вопроса их пигментации, так как *борреби* по большей части депигментированы. Альтернативная гипотеза объясняет возникновение страндида альпинизацией *тюдальского типа*. Похоже, страндиды исторически связаны с западно-норвежской культурой фосна (примерно 8000-5000 до н.э.)



Страндид
(из Стоматология норвежцев К.Е. Шрайнера)

Суб-адриатический тип

= *норид* по типологии Деникера.

Суббрахицефальный

Обладающий головным индексом от 80,01 до 83,33 (согласно французской системе); относительно кругло-/коротко-/широкоголовый.

Субдолихоцефальный

Обладающий головным индексом от 75,01 до 77,77 (согласно французской системе); относительно длинно-/узкоголовый.

Суб-нордид

По типологиям Монтадона и Чекановского, *нордид* с примесью *альпинида*; преобладает в северной Франции; по типологии Деникера представляет собой самостоятельный тип.

Суданид

Подтип *негрида*. "Стандартный негр", ассоциируемый с территориями от Сенегамбии до центрального Судана. Суданиды высокие, широкоплечие, крепкие и мускулистые, характеризуются прогнатизмом, крайне широким и плоским носом с плоской переносицей, выпуклыми губами. Череп большой и узкий (головной индекс 73-77), с высоким сводом и сильно выступающей затылочной костью. Лоб плоский и узкий, лицо большое и скорее длинное. Рот достаточно большой, уши маленькие. Подбородок развит слабо, иногда вдавлен. Цвет кожи - темный.



Суданид
(по Гловацкому)

Судетский тип (преславянский тип по Чекановскому)

Согласно Гюнтеру, малорослый, мелкоголовый мезо-брахицефал, заселяющий территорию Чехии. Характеризуется яйцевидным черепом, выступающими париетальными костями, округлым затылком, мезопрозопией, выдающимися зигоматическими костями, плоским, низким лбом, широким плоским носом и выступающей челюстью. Судетский тип темноволос и темноглаз. Реальное родство этого типа не ясно, так как черты, характерные для него, распространены среди других расовых типов по всей Центральной и Восточной Европе. См. *волгид*.

Сундадонтия

"Индийский" тип зубов, противоположность *синодонтии*.

Т

Тавастид

Согласно Лундману, наиболее западный из двух подтипов *восточного балтида* (другим является *саволаксид*).

Тахителия

Термин, введенный Г.Г.Симпсоном, описывает высокий процент эволюционных изменений. См. *брадителия*, *горотелия*.

Таигид (байкалид)

Подтип *тунгида*, распространенный в тунгусо-язычных регионах Сибири, между Чукоткой/Камчаткой и Енисеем, Северным Ледовитым Океаном и Китаем/Монголией. Таигиды характеризуются низким ростом, пикническим сложением, наиболее монголоидными чертами лица, весьма распространенным эпикантусом, низким и широким черепом, широким и плоским лицом, ортогнатизмом, значительным выступанием скул, очень малым выступанием носа, тонкими губами. Волосы прямые и мягкие, глаза и волосы темного оттенка или черные, кожа очень светлая, иногда подобна коже северо-европеоидов. Рост волос на теле слабый.

Низколицеве южно-сибирские таигиды распространены среди эвенков, тюрко-говорящих тувинцев и тофаларов.



**Эвенкская женщина
типа таигид**

Таксономия

Ветвь науки, занимающаяся изучением классификации организмов на основании эволюционных взаимоотношений

Тасманид

Курчавоволосый подтип *австралида*, заселявший до середины 19 века почти всю Тасманию. Тасманиды были истреблены, однако некоторые аборигены Австралии являются их потомками.



**Тасманид
(Труганини, последний из тасманидов)**

Тауриды

Европеоидная парасемья, результат *конвергентной эволюции*, названная так из-за ее ассоциации с Таврийскими горами в Турции. Главные типы тауридов это *динарид* (динарид, адриатид, норид), *арменоид* (арменид, анатолид, кавказид/мтебид). Морфология тауридов характеризуется целым набором черт; высоким ростом, короткой, но узкой головой с плоским затылком, большим и выгнутым носом (результат процесса *динаризации*, а не мутации). Центрально-азиатские *памиириды*, предположительно, также частично являются тауридами.

Тевтонордический тип

= *хальштаттский нордический тип* по типологии фон Эйкштедта.

Тевтонский тип

= *нордический тип* по ранней типологии Рипли.

Тибетид

= *киангид*.

Тип

Таксономическая категория рангом выше *класса* и ниже *царства*.

Типология

Классификация согласно иерархически расположенным диагностическим критериям.

Тихоокеанская раса

= *полинезид* по типологии Агассиса.

Томсона-Бакстона правило

Биологическое правило, согласно которому популяции, живущие в сухом, холодном климате обладают более низким носовым индексом (узкие и длинные носы), в то время как популяции, живущие в жарком, влажном климате обладают широкими и короткими носами.

Трондер

Специфический скандинавский "составной" тип, морфологически нордический (или нордоидный) и характеризующийся определенным числом переходных вариаций (см. *хардангерский тип*, *оркдальский тип*, *валле тип*). Основу типа трондер составляют высокий, высокоголовый тип культуры шнуровой керамики, элементы собственно нордического типа (*хальштаттского типа*), а также *борреби*.



Норвежский трондер
(из Расы Европы К.С. Куна)

Тропическая азиатская раса

= *палео-монголид* по типологии Агассиса.

Тунгид (кумид по Лундману)

Один из двух основных монголоидных типов Северной Азии (вторым является *синид*). Тунгиды характеризуются широким лицом, высоким головным индексом, низким индексом высота-длина, крайнее монголоидными чертами лица (развитие эпикантуса, строение скул итд.), и средним ростом. Тунгиды распространены в Сибири, Монголии и Туркестане - т.е. на большинстве алтайско-язычных территорий. Подтипы: *амур-сахалинид*, *таигид*, *кумид*.



Тунгид
(из Лексикона Фишера)

Туранид (турко-татарский тип по Деникеру)

Среднеазиатский тип, названный (и позже переименованный) Деникером. По типологии фон Эйкштедта, *памиириды* являются относительно несмешанными туранидами, в то время как *аралиды* являются туранидами с сильным монгольским влиянием (*тунгидного типа*). Некоторые антропологи по-прежнему используют этот термин ко всему смешанному европеоидо-монголоидному населению Средней Азии.

Турко-татарский тип (турко-татарская раса)

= *туранид* по более поздней типологии Деникера.

Тюдальский тип

Очень высокий, темнопигментированный *кроманьид*, абориген центральной Скандинавии. Люди тюдальского типа крепки, коротконоги и длинноруки, очень долихоцефальны (головной индекс 73). Лицо средне-широкое или широкое, подбородок выступает, лоб низкий и плоский, надбровные дуги сильно развиты, нос, как правило, короткий, округлый и широкий. Волосы черно-коричневые, глаза темные, рост бороды сильный. Впервые тип был описан в округе Тюдал в Тронделаге, а позже его присутствие было задокументировано в прилегающих провинциях Швеции. Эта уникальная популяция прожила в изоляции тысячелетия, но в наше время она рассеялась по всему Скандинавскому полуострову, причиной чего послужила высокая мобильность современных людей, миграция в города, урбанизация. Сегодня тюдальский тип нигде не является преобладающим элементом популяции. Тюдальский тип относят к одной из разновидностей *палео-атлантида*.



Тюдальский тип
(из *Dalarnas Folk - Typer och Haerstamning*,
Лундман, 1948)

У

Улотричи

Она из двух "макрорас" по Хаксли, включающая "бушменов" (*коисаниды*), "негритов" (*негритиды*, кроме *андаманидов*), "негров" (*негриды*) и "минкописов" (*андаманиды*). См *леиотричи*.

Ультрабрахицефальный

Обладающий головным индексом 90,0-94,9; чрезвычайно кругло-/коротко-/широколицый.

Ультрадолихоцефальный

Обладающий головным индексом 55,0-59,9; чрезвычайно длинно-/узколицый.

Умеренная азиатская раса

= *синид* и *тунгид* ("нео-монголид") по типологии Агассиса.

Уралид

Термин, иногда используемый как синоним *лаппоида*, иногда по отношению к другим, менее определенным центральноазиатским типам.

Ф

Ф1 поколение

Первое потомственное поколение (филиал). Следующее и дальнейшие поколения называются Ф2, Ф3 итд.

Фалиан/фалид

= *дало-фалид*.

Фемарнерский тип

Специфический фенотип *борреби*, распространенный на немецком острове Фемарн.

Фенетическая классификация

Метод классификации, при котором виды группируются по признаку их фенотипической схожести.

Фенотип

Заметные или определяемые характеристики живого организма. Внешнее выражение *генотипа*.

Физическая антропология (биологическая антропология)

Наука, изучающая механизмы биологической эволюции, генетическое наследование, человеческую адаптивность и видоизменения, морфологию приматов, скелетные останки человеческой эволюции. Частичный синоним "расовой антропологии".

Филетический градуализм

= *градуализм*.

Филогения

Прослеживание истории эволюционного развития формы жизни; эволюция линии.

Финно-нордический тип

Гипотетический восточный нордический тип по типологии фон Эйкштедта.

Фостера закон (закон острова)

Эволюционный принцип, выдвинутый Дж.Бристолем Фостером в 1964 году, согласно которому представители одного и того же вида могут быть большими или меньшими по размерам в зависимости от ресурсов окружающей среды. См. *островной лиллипутизм*, *островной гигантизм*.

Фоэталлизация

= *неотения*.

Фризийский тип

= *фритерпийский тип*.

Фритерпийский тип (фризийский тип)

Слегка измененная (влияние *кроманьида*) разновидность *нордического типа*, распространенная в Нидерландах и на традиционных территориях расселения фризских племен вдоль северо-западного побережья Европы. Тип подобен *англо-саксонскому нордическому типу*, но влияние *кроманьида* в нем меньше. Термин был введен Ньессеном.

Функциональная морфология

Отношения между формой и функцией в организме, в адапционном и эволюционном контексте.

Фэлиш

= *дало-фалид* по типологии Гюнтера.

Х**Хальштаттский нордический тип (*готатип* по Лундману; *остердальсий тип* по Брюну; *тевтонордид* по фон Эйкштедту и Паудлеру)**

Классический нордический тип, господствующий в Швеции и юго-восточной Норвегии; распространен по всей Скандинавии, составляет небольшой процент населения северной Германии, стран Бенилюкс и Британских островов.



**Хальштаттский нордический тип
(Макс фон Сюдов, Швеция)**

Хамацефальный

Обладающий индексом длина-высота менее 79; низкоголовый. Явление называется *хамацефалией*, а индивид с подобным индексом - *хамацефалом*.

Хамеринный

Обладающий носовым индексом 51,0 и больше; относительно широконосый.

Хамитская раса

= *эфиопид* по типологии Гюнтера.

Хардангерский тип

Специфический фенотип, ассоциируемый с разновидностью *трондера*, названный по имени горного региона, окружающего фьорд Хардангер в Норвегии. Тип представляет собой пример доминации черт *типа культуры шнуровой керамики*.



Хардангерский тип
(из Стоматология норвежцев К.Е. Шрайнера)

Харди-Вайнберга закон

Закон, согласно которому, если популяция не подвергается селекции, мутациям, миграциям, генетическому дрейфу и случайному спариванию, частота каждой аллели и всего генотипа остается одной и той же из поколения в поколение.

Хоид

= *северный синид* по типологии Лундмана (который сам первоначально использовал термин "северный синид").

Homo sapiens afer

= *негрид*.

Homo sapiens albus

= *европеоид*.

Homo sapiens americanus

= *индианид*.

Homo sapiens asiaticus

= *монголид*.

Homo sapiens australicus

= *австралид*.

Homo sapiens fennicus

= *восточный балтид* по типологии Серги.

Homo sapiens hottentotus

= *коисанид*.

Хроматическая шкала фон Лушана

Стандартная шкала оттенков кожи, используемая большинством антропологов (к примеру, К.С.Куном).




**Шкала
фон Лушана**

Хромосомы

Цепочки ДНК, находящиеся в нуклеотидах всех клеток организма.

Хатон, Эрнст Альберт

(1887-1954) Американский антрополог, известный в свое время тем, что превратил Гарвардский Университет в центр физической антропологии в США. Его расовая типология описана в книгах, к примеру, в "От обезьяны" (1931).



**Взгляд Хатона
на филогению**

Ц

Царство

Наивысшая таксономическая единица, рангом выше *типа*.

Цевеннин

Термин, предложенный Лундманом, включает в себя все европейские *альпиноидные* виды, включая *альпинида* и *страндида*.

Центрально-азиатский междуречный тип

= *памирид* по типологиям некоторых русских ученых.

Централид (*американская тропическая раса* по Агассису; *истмид* по Лундману)

Тип *индианида*. Средне- или малорослый, приземистый, инфантилизированный и брахицефальный тип, присущий территориям между южным побережьем США, Нью-Мехико и Аризоной (Пуэбло, Хопи итд.), восточной и южной Мексикой (потомки мая и ацтеков), Центральной Америкой и западной Колумбией. Централиды характеризуются относительно плоским, но узким лбом, прямоугольными лицами, относительно грацильными чертами, не типично монголоидным строением глаза, средне-широким или широким прямым или слегка изогнутым выдающимся носом, гладкими или слегка волнистыми волосами и средне-коричневой кожей. Тип географически весьма различен, и Биасутти разделил его на два подтипа - южный гипербрахицефальный *истмид* и северный брахицефальный *пуэблид*.



**Центрально-американский
централид**

Центральный синид (киангид по Лундману)

Подтип *синида*. На самом деле, в большей степени искусственный термин, чем настоящая типологическая категория. Относится к типам, промежуточным между *северным* и *южным синидом*.



**Центральный синид
(из Лексикона Фишера)**

Цефалометрия

Измерение головных показателей живого человека. См. *краниометрия*, *антропометрия*.



Цефалометрические точки

Ч

Чанселад

Скелет мужчины, найденный в пещере Раймонден, недалеко от Чанселада в Дордонье, Франция, в 1888 году, датируемый 15000 лет до н.э., и относимый к магаленианскому типу. 155 см. ростом, он скорее меньше, чем кроманьонский и прешедмостный тип. Череп долихо- и гипсикраниальный, крупно- и высоколицый, с плоским лбом и округлой, но плоской затылочной областью, что нехарактерно для современных долихоцефалов. Нос чанселада обладал высокой переносицей, был крючковатый и очень тонкий. Подмечено сходство с некоторыми эскимидными и/или монголидными/монголоидными чертами (Кун называл его "инципиентным монголоидом"), но близкого родства, похоже, нет, на что указывают выступающий подборок и отсутствие сглаживания бигониальных углов.

**Чанселад****Чекановски, Ян**


(1862-1965) Польский антрополог, статистик и лингвист, исследуя население Африки разработал различные статистические методы и внес значительный вклад в таксономию. Также сыграл важную роль в развитии индоевропейской сравнительной лингвистики.

**Ян Чекановски****Череп**

Черепная коробка и нижняя челюсть.

**Вид спереди****Анатомический вид****Черепной индекс**

Максимальная длина черепа*100/максимальная ширина черепа.



Долихочерепной Брахичерепной
(C.I. 72.9) (C.I. 88.3)

См. *головной индекс*.

Черкесский тип

= *понтид* по типологиям некоторых русских ученых.

Черная раса

= *негридная раса* по типологии Блюменбаха.

Чосонид

Подтип *северного-синида*, распространенный в Корее; отличается от *китаидного подтипа* большим головным индексом, большим лицом, более широким носом и тонкими губами.

Ш

Шанид

Смесь *палео-монголида* и *южного синида*, специфичная для народа шан.



Шанид (шан)

Швидецки, Ильзе

(1907-1997) Немецкий антрополог, одна из крупнейших мастеров статистической физической антропологии.

Э

Эволюция

Изменение в частотах аллелей от одного поколения к другому.

Эйкштедт, Эгон (Фрайхерр) фон

(1892-1965) немецкий антрополог и этнограф, оказавший значительное влияние на развитие этих областей науки.



Эгон фон Эйкштедт

Экзогамия

Обычай, при котором члены группы, как правило, заключают браки вне своей группы; противоположность *эндогамии*.

Эндогамия


Обычай, при котором члены группы заключают браки только внутри группы; противоположность *экзогамии*.

Эндоморфный

= *пикнический* по соматотипологии Шелдона.

Эпикантус (*plica palpebronasalis*)

Кожная складка верхнего века (от носа к внутренней части глазницы), покрывающая внутренний угол глаза человека. Эта складка прикрывает угол глаза и уменьшается книзу, что создает впечатление "раскосых" глаз. Среди азиатов эпикантус зачастую называют "одиночным веком", противоположностью "двойного века". Эпикантус распространен, прежде всего, у *монголидов* и *коисанидов*.



Эпирский тип

= *динарид*.

Этническая группа

Группа людей внутри большей социальной и культурной общности, которая идентифицирует себя как исторически и культурно единую группу, отличающуюся от остальных групп этой общности.

Эскимид

Разновидность *арктического монголоида*, отличающаяся более выраженным лицевым профилем, широкой нижней челюстью, менее распространенным эпикантусом, узким носом с высокой переносицей, относительно пикническим и массивным телосложением, развитой мускулатурой, темной кожей. Эскимиды распространены в арктических областях Северной Америки, Гренландии, иногда встречаются в береговых зонах Чукотки и Камчатки.



Эскимид
(по Гловацкому)

Эурипрозопный

Обладающий лицевым индексом 80,0-89,9; коротко-/широколицый.

Эфиопид (хамитский тип по Гюнтеру)

Негридный подтип северо-восточной Африки. Эфиопиды долихоцефальны, высоки и стройны, с узкими чертами лица, весьма различным цветом кожи и характером волос. Нос высокий и узкий, и нередко выгнутый, подбородок сильно развит. До сих пор остается открытым вопрос, являются ли эти типично европеоидные черты результатом сильного влияния *медитерранидов/арабидов* или это результат эволюции внутри негридной расы.



**Эфиопид
(Иман)**

Эфиопийский тип

= *негрид* (возможно, включая *коисанида*) по типологии Блюменбаха.

Ю**Южно-американская умеренная раса**

Все южно-американские *индианидные* типы по типологии Агассиса.

Южный медитерранид

Синоним *сахарида* в типологии Лундмана. Другое значение - медитерранид с влиянием *берберида*.

Южный синид

Подтип синида. Южные синиды характеризуются широкими лицами и носами, высоким головным индексом, крайне высоким индексом высота-длина, меньшим содержанием жира в тканях, средним или низким ростом.



Южный синид
(из Лексикона Фишера)

Я

Якунинский тип

= *тип кошу*.

Перевод с англ.: Владимир Хозинский



Мнение автора сайта не всегда совпадает с мнением авторов публикуемых материалов!

Ист.: www.snpa.nordish.net

